

PAPER DETAILS

TITLE: Manavgat Nehri Nehiragzi Bölgesi Zooplanktonunun Sistematik ve Ekolojik Yöneden İncelenmesi

AUTHORS: Ömer ERDOĞAN,Ömer Osman ERTAN

PAGES: 12-28

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214187>

Manavgat Nehri Nehirağzı Bölgesi Zooplanktonunun Sistemik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

Ömer ERDOĞAN*, Ömer Osman ERTAN

¹Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü / ISPARTA

*Sorumlu yazar:omererdogan@sdu.edu.tr

Özet

Ocak-Aralık 2009 tarihleri arasında Manavgat Nehri'nden seçilen 5 istasyondan aylık örneklemeler yapılmış, bazı fizikokimyasal değişkenler ile zooplankton tür bileşimi ve yoğunluğu araştırılmıştır.

Manavgat Nehri nehir ağzı bölgesinde Copepoda yoğunluğu en yüksek ağustos (22883 ± 8156 org/m³), en düşük mart (2160 ± 726 org/m³) ; Rotifera yoğunluğu en yüksek şubat (1820 ± 641 org/m³), en düşük eylül (644 ± 298 org/m³); Cladocera yoğunluğu en yüksek ağustos (2279 ± 386 org/m³), en düşük ocak (204 ± 71 org/m³); diğer organizmaların yoğunluğu en yüksek şubat (2105 ± 530 org/m³), en düşük nisan ($549,49 \pm 202$ org/m³) aylarında belirlenmiştir. Manavgat Nehri nehir ağzı bölgesinde baskın olarak görülen türler *Oithona nana*, *Clausocalanus arcuicornis*, *Acartia discaudata*, *Paracalanus parvus*, *Bosmina longirostris* ve *Keretella cochleris* olarak saptanmıştır ve bu türler örihalin karakterindeki zooplankton türleridir.

Anahtar kelimeler: Manavgat Nehri, Östarin, Zooplankton

*Bu çalışma Doktora tezinden özetlenmiştir.

The investigated as taxonomical and ecological of zooplankton in Manavgat Estuary

Abstract

The physicochemical features and species composition and density of zooplankton of Manavgat estuary investigated monthly sampling from selected 5 stations between January and December, 2009.

In Manavgat River estuarine zone, the highest and the lowest Copepoda density respectively august (22883 ± 8156 ind./m³) and march (2160 ± 726 ind./m³); the highest and the lowest Rotifera density respectively february (1820 ± 641 ind./m³) and september (644 ± 298 ind./m³); the highest and the lowest Cladocera density respectively august (2279 ± 386 ind./m³) and january (204 ± 71 ind./m³); the highest and the lowest other organisms respectively february ($2105,33 \pm 530$ ind./m³) and april (549 ± 202 ind./m³).

The dominant taxa in Manavgat River estuarine zone consist of *Oithona nana*, *Clausocalanus arcuicornis*, *Acartia discaudata*, *Paracalanus parvus*, *Bosmina longirostris* and *Keretella cochleris* and these species are euhaline character types of zooplankton.

Key words: Manavgat River, Estuary, Zooplankton


GİRİŞ

Nehirağzıları, nehirlerin denizlere açıldığı gel-git etkisindeki bölgelerdir. Bu bölgeler genel olarak kıyıl bölgenin dar olduğu alanlarda tatlı su ve deniz suyunun karışımından oluşan acı su (miksohalin) ortamlarıdır (Kocataş, 2006). Bu çalışmada Akdeniz'e dökülen Manavgat Nehri nehir ağzı bölgesinin fizikokimyasal özellikleri, zooplanktonun çeşitliliği, aylara ve istasyonlara göre dağılımı ve bolluğu saptanmıştır. Zooplanktonda bulunan taksonların belirlenmesi, ülkemizin canlı çeşitliliğinin tespitine katkı sağlayacak, planktonla ilgili bulgular, örneklerinin fizikokimyasal özellikleri ile ilişkilendirilecektir. Zooplankton sistematiğine yönelik şu ana kadar yapılmış birçok çalışma bulunmasına karşın bu çalışmaların çoğu ya tatlı su ya da denize yönelik çalışmalar olmuştur (Dönmez, 1998; Sever ve Mavili, 2002). Türkiye'de en yüksek biyolojik verimliliğin ortaya çıktığı nehir ağzıları ile ilgili az çalışma vardır (Işınabilir,

MATERYAL VE METOT

Manavgat Nehri'nin kaynak suları Antalya-Akseki ilçesine bağlı Cevizli Beldesi'nin kuzeybatısındaki Akdağ ve Beyşehir Gölü'nün güneyindeki dağlardan çıkan kaynak suları ile Gembos kapalı havzasının güneyindeki suların birleşmesiyle oluşur. Deniz seviyesinden 1000–2000 metre yükseklikte olan Manavgat Nehri'nin başlangıcı yazın kuruyan küçük bir akarsu görünümündedir. Bu bölgedeki küçük akarsuların birleşmesiyle Manavgat Nehri oluşur. Yaklaşık 90 km uzunluğundaki bu nehir Manavgat ilçesinin ortasından geçerek Dalyan adı verilen yerde geniş bir nehirağzı ile Akdeniz'e dökülür. Özellikle nehirağzı bölgesinde çok sayıda tur teknesi ve piknik alanları az sayıda balık çiftlikleri bulunur (Küçük, 1997).

Ocak-Aralık 2009 tarihleri arasında, 12 ay süreyle ayda bir kez olmak üzere yürütülen örnekleme dönemi boyunca her bölge için nehirağzı bölgesinden 3, nehir ve deniz etkisinin olduğu bölgelerden birer olmak üzere toplam 5 istasyondan örnekleme yapılmıştır (Şekil 1).



Şekil 1. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi ve istasyonlar (Google Earth, 2011)

Zooplanktonik organizmalar nehir ve nehirağzı bölgesi için yatay ve dikey plankton çekimi ile denizde ise 10, 20 ve 30 metre derinliklerden dikey çekimler yapılarak elde edilmiştir. Plankton çekimlerinde ön ağız çapı 17 cm ve ağ göz açıklığı 55 μ m olan Hensen tipte plankton kepçesi kullanılmıştır. Örneklerin alınmasında dikey çekimler için yerine sabitlenen bir tekneden, üzeri metrik olarak ölçeklendirilmiş bir ipin ucuna bağlanan plankton kepçesi ile dikey yönde, yaklaşık 1 m/s hızla çekilmesiyle alınmıştır. Toplanan örnekler, 500 ml'lik plastik örnekleme kaplarına konulmuş, plankton kepçesinin bezine yapışan organizmalar su ile bir kez yıkanmış ve şişedeki örneğin üzerine eklenmiştir. Yatay çekimlerde 1,5-2 km/saat hızla 2-3 dk çekim yapılmış, toplanan örnekler yine 500 ml'lik plastik örnekleme kaplarına konulmuştur. Süzülen su miktarının hesaplanabilmesi için plankton kepçesine flowmetre (akıntı ölçer) takılmıştır. Toplanan plankton örnekleri, kavanozlara aktarıldıktan sonra % 4'lük formaldehit çözeltisi ile tespitlenmiştir. (Özel, 1992).

Rotifera'nın taksonomik incelemesinde ilgili kaynaklardan yararlanılmıştır (Edmondson, 1959-a; Elster and Ohle, 1974; Pontin, 1978; Koste, 1978-a, b, Rutner-Kolisko, 1974).

Rotifera dışındaki zooplanktonik organizmalar önce büyütme sterio mikroskopta bütün olarak incelenmiş, tanıya ilişkin özelliklerin ayrıntılı bir şekilde görülebilmesi için türler, 1/1 oranında hazırlanmış olan gliserin-alkol karışımında bir süre bekletilip saydamlaştırılmıştır. Bu şekilde fotoğrafları çekildikten sonra üzerinde bir damla gliserin-alkol karışımı bulunan temiz bir lama alınarak incelenmiştir. Diseksiyon sonucu ortaya çıkan parçalar incelenerek tür tanımları yapılmıştır. (Harris et al., 2000 ; Bekleyen, 1997). Cladocera'nın taksonomik incelemesinde Edmondson (1959-b) , Smirnov (1996) Copepoda'nın taksonomik incelemesinde Rose (1933), Brodskii (1950), Grice (1962), Kasturirangan (1963), Frost and Fleminger (1968), Edmondson (1959-c), Bayly (1972), Newel and Newel (1977), Mazzocchi et al., (1995), Einsle (1996), Palomares et al., (1998), Boltovskoy (1999-a,b), Bradford-Grieve (1999), Dussart and Defaye (2001), Özel (2003), Boxshall and Halsey (2004-a,b), Zununi (2006), den diğer organizmaların taksonomik incelenmesinde Tregouboff and Rose (1957), Boltovskoy, (1999-a,b), Perry (2003) den yararlanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi, 2009 yılı Ocak-Haziran döneminde ayrılmış istasyonlarda belirlenen yüzey suyu nitelik değerleri (Ortalama $\pm$ S.H., n=12)

İstasyonlar					
Parametre	1. istasyon	2. istasyon	3. istasyon	4. istasyon	5. istasyon
Su sıcaklığı (°C)	22,94 $\pm$ 1,22 ^a	15,12 $\pm$ 0,55 ^b	14,53 $\pm$ 0,63 ^b	14,02 $\pm$ 0,62 ^b	13,74 $\pm$ 0,69 ^b
pH	8,37 $\pm$ 0,02 ^a	8,38 $\pm$ 0,03 ^a	8,35 $\pm$ 0,03 ^a	8,38 $\pm$ 0,03 ^a	8,36 $\pm$ 0,04 ^a
Çöz. Oksijen (mg/l)	8,02 $\pm$ 0,08 ^c	8,29 $\pm$ 0,05 ^{bc}	8,55 $\pm$ 0,08 ^b	9,50 $\pm$ 0,13 ^a	9,94 $\pm$ 0,16 ^a
Tuzluluk (ppt)	35,86 $\pm$ 0,09 ^a	3,90 $\pm$ 1,54 ^b	0,68 $\pm$ 0,20 ^c	0,24 $\pm$ 0,03 ^c	0,15 $\pm$ 0,01 ^c
El. İletkenlik (µS/cm)	52766,66 $\pm$ 775,21 ^a	5485,36 $\pm$ 1966,84 ^b	962,96 $\pm$ 262,11 ^c	464,35 $\pm$ 86,11 ^c	272,25 $\pm$ 18,25 ^c
Klorofil a (mg/m ³)	1,41 $\pm$ 0,09 ^b	3,16 $\pm$ 0,45 ^a	3,52 $\pm$ 0,47 ^a	3,16 $\pm$ 0,39 ^a	1,09 $\pm$ 0,09 ^b
Secchi Diski (m)	12,41 $\pm$ 0,58 ^a	1,14 $\pm$ 0,04 ^b	1,17 $\pm$ 0,06 ^b	0,94 $\pm$ 0,04 ^b	0,88 $\pm$ 0,03 ^b

Tablo 2. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi, 2009 yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrımlı istasyonlarda belirlenen dip suyu nitelik değerleri (Ortalama $\pm$ S.H., n =12)


Parametre	İstasyonlar				
	1.istasyon (30m)	2. istasyon	3. istasyon	4. istasyon	5. istasyon
Su sıcaklığı (°C)	22,71 $\pm$ 1,22 ^a	20,59 $\pm$ 1,50 ^{ab}	18,96 $\pm$ 1,64 ^{abc}	16,90 $\pm$ 1,47 ^{bc}	13,67 $\pm$ 0,71 ^c
pH	8,35 $\pm$ 0,02 ^a	8,36 $\pm$ 0,03 ^a	8,30 $\pm$ 0,03 ^a	8,38 $\pm$ 0,03 ^a	8,34 $\pm$ 0,03 ^a
Çöz. Oksijen (mg/l)	7,88 $\pm$ 0,06 ^{bc}	7,43 $\pm$ 0,08 ^c	7,86 $\pm$ 0,81 ^{bc}	8,56 $\pm$ 0,13 ^b	9,60 $\pm$ 0,14 ^a
Tuzluluk (ppt)	35,83 $\pm$ 0,08 ^a	20,49 $\pm$ 4,03 ^b	16,88 $\pm$ 4,54 ^b	0,6 $\pm$ 0,21 ^c	0,19 $\pm$ 0,02 ^c
El. İletkenlik (µS/cm)	52958,33 $\pm$ 746,75 ^a	27693,33 $\pm$ 6118,60 ^b	24729,49 $\pm$ 6822,53 ^b	759,35 $\pm$ 6470,39 ^c	342,45 $\pm$ 34,81 ^c


Aynı satırdaki farklı harfler, istasyonlar arası farklılıkları göstermektedir (P < 0,05)

Fiziksel ve Kimyasal Parametreler

Araştırma süresince, Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi'nde belirlenen, yüzey ve dip suyu nitelik değerlerinin istasyonlara göre değişimi tablo 1 ve tablo 2 de verilmiştir.


Sıcaklık: Araştırma süresince, yüzey suyunda en yüksek sıcaklık değeri 31 °C (ağustos, 1. istasyon yüzey), en düşük 10,2 °C (ocak, 5. istasyon); dip sularında en yüksek sıcaklık değeri 31°C (ağustos, 2. istasyon), en düşük ise 10 °C (ocak, 5. istasyon) olarak ölçülmüştür (Şekil 2). Yüzey ve dip suyu arasındaki farklılık ağustos ayında önemli (P<0,05), diğer aylarda önemsiz bulunmuştur (P>0,05).






Şekil 2. Manavgat Nehri nehiragzı bölgesi yüzey ve dip suyu sıcaklık değerleri (°C)

Tuzluluk: Yüzey sularında en yüksek tuzluluk değeri 36,4 ppt (eylül, 1. istasyon yüzey), en düşük 0,1 ppt (aralık, 5. istasyon), dip sularında en yüksek 36,3 ppt (eylül, 1. istasyon 20,30 m), en düşük 0,1 ppt (nisan, mayıs, haziran, 4. istasyon, nisan, mayıs, haziran, ocak, kasım ve aralık, 5. istasyon) olarak belirlenmiştir (Şekil 3.). Yüzey ve dip suyu arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur ($P>0,05$).



Şekil 3. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi yüzey ve dip suyu tuzluluk değerleri (ppt)

Çözülmüş Oksijen: Çözülmüş oksijen değeri yüzey sularında en yüksek 10,9 mg/l (şubat, 5. istasyon), en düşük 7,64 mg/l (eylül, 1. istasyon yüzey), dip sularında en yüksek 10,6 mg/l (şubat, 5. istasyon), en düşük 7,3 mg/l (ağustos, 3. ve 4. istasyon 30 m)olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Yüzey ve dip suyu arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur ($P>0,05$).



Şekil 4. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi yüzey ve dip suyu çözünmüş oksijen değerleri (mg/l)

Zooplankton Taksonları

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesinde zooplanktonda Rotifera'dan 22, Cladocera'dan 11, Copepoda'dan 32, Cnidaria, Foraminifera, Tintinida, Cirripedia, Bivalvia, Polychaeta, Chaetognatha, Decapoda, Ostracoda, İhtiyoplankton'ndan 1'er olmak üzere toplam 75 takson belirlenmiş olup bu taksonlar aşağıda sınıflandırılmıştır.

Tablo 3.Manavgat Nehri nehirağzı bölgesinde zooplankton taksonları

ROTİFERA	Acartia latisetosa (Giesbrecht, 1892)
<i>Euchlanis dilatata</i> Ehr., 1832	<i>Acartia discaudata</i> Giesbrecht, 1892)
<i>Euchlanis deflexa</i> (Gosse, 1851)	<i>Acartia negligens</i> (Dana, 1849)
<i>Trichotria pocillum</i> (Müller, 1773)	<i>Acartia grani</i> (Sars, 1904)
<i>Macrochaetus collinsi</i> (Gosse, 1867)	<i>Paracalanus parvus</i> (Claus, 1863)
<i>Colurella uncinata</i> (Müller, 1773)	<i>Paracalanusaculeatus</i> (Giesbrecht,1888)
<i>Colurella</i> sp. (Müler, 1773)	<i>Paracalanusnanus</i> (Sars, 1907)
<i>Lepadella ovalis</i> (Müler, 1786)	<i>Calocalanusstyliremis</i> Giesbrecht,1888
<i>Asplanchna priodonta</i> Gosse, 1850	<i>Acrocalanus</i> sp.
<i>Testudinella patina</i> (Herman, 1783)	<i>Temora stylifera</i> (Dana, 1849)
<i>Brachionus plicatilis</i> (Müler, 1786)	<i>Candacia armata</i> Boeck, 1872
<i>Keratella cochlearis</i> (Gosse, 1851)	<i>Labidocera</i> sp.
<i>Keratella quadrata</i> (Müller, 1786)	<i>Pontella mediterranea</i> (Claus, 1863)
<i>Lecane luna</i> (Müler, 1776)	<i>Pleuromamma gracilis</i> (Claus, 1863)
<i>Lecane lunaris</i> (Ehr., 1832)	<i>Mecynocera clausi</i> (Thompson, 1888)
<i>Cephalodella gibba</i> (Ehr., 1838)	<i>Centropages furcatus</i> (Dana, 1852)
<i>Trichocerca longiseta</i> (Schränk, 1802)	<i>Centropages kroyeri</i> (Giesbrecht,1892)
<i>Ascomorpha ovalis</i> (Carlin, 1943)	<i>Centropages violaceus</i> (Claus, 1863)
<i>Gastropus stylifer</i> (Imhof, 1891)	<i>Phaenna spinifera</i> (Claus, 1863)
<i>Rotaria</i> sp.	<i>Oithona nana</i> (Giesbrecht, 1892)
<i>Synchaeta</i> sp.	<i>Oithona plumifera</i> (Baird, 1843)
<i>Polyarthra vulgaris</i> (Carlin, 1943)	<i>Oithona helgolandica</i> (Claus, 1863)
<i>Testudinella patina</i> (Herman, 1783)	<i>Cyclops abyssorum</i> (Sars, 1863)
CLADOCERA	<i>Corycaeus</i> sp.
<i>Ceriodaphnia pulchella</i> Sars, 1862	<i>Oncaeamediterranea</i> (Claus, 1863)
<i>Daphnia longispina</i> O. F. Müller, 1785	<i>Oncaea minuta</i> (Giesbrecht, 1892)
<i>Daphnia cucullata</i> (Sars 1862)	<i>Euterpina acutifrons</i> (Dana, 1852)
<i>Diaphanosoma</i> sp.	<i>Microsetella rosea</i> (Dana, 1848)
<i>Bosmina longirostris</i> (O. F. Müller, 1785)	DİĞERLERİ
<i>Moina micrura</i> Kurz, 1874	Cnidaria (Actinula larvası)
<i>Chydorus sphaericus</i> (O. F. Müller, 1776)	Foraminifera
<i>Penilia avirostris</i> (Dana, 1849)	Tintinida
<i>Evadne spinifera</i> P.E.Muller, 1867	Cirripedia
<i>Evadne nordmanni</i> (Lovén, 1836)	Bivalvia
<i>Podon polyphemoides</i> (Leuckart,1859)	Polychaeta
COPEPODA	Chaetognatha
<i>Clausocalanus arcuicornis</i> (Dana, 1849)	Ostracoda
<i>Clausocalanus furcatus</i> (Brady, 1883)	Decapoda (Zoea)
<i>Pseudodiaptomus marinus</i> (Sato, 1913)	Ihtiyoplankton
<i>Acartia clausi</i> (Giesbrecht, 1889)	


Zooplankton gruplarına ilişkin yoğunluk ve oranın aylara göre değişimi tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Zooplanktonun farklı gruplara bağlı olarak yoğunluğun aylara göre değişimi

	Copepoda	Rotifer	Cladocera	Diğer
Ocak	4771±1104 ^{cd}	1686±600 ^a	204±71 ^{bcd}	781,89±167 ^b
Şubat	4712,33±1161 ^{cd}	1820±641 ^a	456±172 ^{bcd}	753,83±168 ^b
Mart	2160±726 ^d	644±298 ^a	506±230 ^{bcd}	638,33±157 ^b
Nisan	2924,67±1018 ^d	904±214 ^a	576±161 ^{bcd}	549,49±202 ^b
Mayıs	3152±1000 ^d	787±299 ^a	616±206 ^{bcd}	588,06±173 ^b
Haziran	7298,67±2356 ^{bcd}	790±195 ^a	1166,67±323 ^{abc}	684±143 ^b
Temmuz	21167,33±7513 ^{ab}	934±263 ^a	1979,33±397 ^{ab}	2105±530 ^a
Ağustos	22883±8156 ^a	720±266 ^a	2279±386 ^{ab}	2065±509 ^a
Eylül	21069,33±7249 ^{abc}	705±283 ^a	2118,67±354 ^{ab}	2081±508 ^a
Ekim	17870,67±7273 ^{bcd}	685±283 ^a	1921±355 ^{abc}	2051±508 ^a
Kasım	14534,67±4292 ^{bcd}	905±377 ^a	1467,67±255 ^{abc}	1838±501 ^a
Aralık	10425,33±3092 ^{bcd}	884±318 ^a	1093,33±261 ^{abc}	1634±523 ^a


Aynı sütundaki farklı harfler aylar arasındaki farklılığı göstermektedir ($P < 0,05$)

Kopepod yoğunluğu en yüksek ağustos (22883±8156 org/m³), en düşük mart (2160±726 org/m³); rotifer yoğunluğu en yüksek şubat (1820±641 org/m³), en düşük eylül (644±298 org/m³); kladoser yoğunluğu en yüksek ağustos (2279±386 org/m³), en düşük ocak (204±71 org/m³); diğer organizmaların yoğunluğu en yüksek şubat (2105±530 org/m³), en düşük nisan (549,49±202 org/m³) aylarında belirlenmiştir (Şekil 5).




Şekil 5. Zooplankton grupları yoğunluğunun aylara göre değişimi

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi 2.,3.,4. ve 5.istasyonlarda (deniz bölgesi hariç) yatay çekimler sonucu elde edilen zooplankton gruplarının ortalama yoğunluğunun istasyonlara bağlı olarak değişimi şekil 6'da verilmiştir. En yüksek yoğunluk 3. istasyonda Copepodlarda görülmüştür ($14191,66 \pm 3266 \text{ org/m}^3$). En yüksek zooplankton yoğunluğu ortalaması $17918,33 \pm 3670 \text{ org/m}^3$ ile 3. istasyonda görülmüştür.




Şekil 6. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi 2.,3.,4. ve 5. istasyonlarda (deniz bölgesi hariç) yatay çekimler sonucu elde edilen zooplankton gruplarının ortalama yoğunluğu (org/m^3)

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi 2.,3.,4. ve 5.istasyonlarda (deniz bölgesi hariç) dikey çekimler sonucu elde edilen zooplankton gruplarının ortalama yoğunluğunun istasyonlara/bağılı olarak değişimi şekil 7'de verilmiştir. En yüksek yoğunluk Copepodlarda görülmüştür. (3. İstasyon, $25635,83 \pm 5966 \text{ org/m}^3$). En yüksek zooplankton yoğunluğu ortalaması $29732,5 \pm 6555 \text{ org/m}^3$ ile 3. istasyonda görülmüştür




Şekil 7. Manavgat Nehri nehirağzı bölgesi 2.,3.,4. ve 5.istasyonlarda (deniz bölgesi hariç) yatay çekimler sonucu elde edilen zooplankton gruplarının ortalama yoğunluğu (org/m^3)

1. istasyonda (deniz bölgesi) 10, 20 ve 30 metre derinliklerdeki zooplankton yoğunlukları Şekil 8.'de verilmiştir. En yüksek zooplankton yoğunluğuna (14640 org/m^3) ağustos ayında 20 metre derinlikte rastlanılmıştır. Derinlikler arasındaki farklılık önemli bulunmamıştır ($P>0,05$).



Şekil 8. 1. istasyon (deniz bölgesi)'nda 10, 20 ve 30 metre derinliklerdeki zooplankton yoğunlukları(org/m^3)


Tüm istasyonlarda yatay ve dikey çekimlerin ortalaması üzerinden zooplanktonun yıl boyu göstermiş olduğu gelişim eğrisi incelendiğinde en yüksek zooplankton miktarı ağustos ayında gerçekleşmiştir. Toplam zooplankton yoğunluğunun en düşük olduğu ay mayıs ayıdır. Ağustos ayındaki toplam zooplankton yoğunluğu $27947 \pm 8780,45 \text{ org/m}^3$ olarak belirlenmiştir (Şekil 9).



Şekil 9.Toplam zooplankton yoğunluğunun aylara göre değişimi (org/m^3)

Sık Görülen Türler

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesinde araştırma süresince sık görülen türler ve bu türlerin aylara bağlı olarak birey sayıları Şekil 10' da verilmiştir.



Şekil 10. Araştırma süresince sık görülen türler

TARTIŞMA VE SONUÇ

Nehirağzı bölgeleri deniz ve tatlı suyun birleştiği bölgeler olup, bu bölgelerde nehrin tatlı suları yoğunluk farkından dolayı su sütununun üst kısmında bulunurken, denizin daha yoğun olan tuzlu suları suyun aşağı kesiminden nehirağzı bölgesine doğru ilerler. Bu nedenle araştırmamızda yapılan fiziko-kimyasal ölçümler ve planktonla ilgili örneklemeler bu durumu yansıtabilecek şekilde yapılmıştır (dip ve yüzey kesimi).

Manavgat Nehri'nde dip suyu sıcaklık değerleri yüzey suyu değerlerine göre deniz bölgesi hariç (1. istasyon) tüm istasyonlarda yıl boyu daha yüksektir. Kış aylarında tatlı suyun debi artışına bağlı olarak nehrin etkisi fazla iken, yaz aylarında bu suyun debisinin azalmasıyla, deniz etkisinin artışına paralel yüzey ve dip suyu sıcaklık farkı yükselmiştir. Bu farklılık özellikle 2., 3. ve 4. istasyonlarda daha belirgin gözükmemektedir. Yüzey ve dip suyu arasındaki sıcaklık farklılığı Ağustos ayında önemli ($P < 0,05$) diğer aylarda önemsiz bulunmuştur ($P > 0,05$). Benzer şekilde yaz aylarında denizin etkisinin artmasıyla dip suyu tuzluluğu 2. ve 3. istasyonlarda 35 ppt'nin üzerine çıkmaktadır. Yüzey ve dip suyu arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur ($P > 0,05$). Bölgede mart ve nisan aylarında görülen sel yüzünden tuzluluk değerleri dip ve yüzey sularında düşüktür. Nehirağzı'nda çözünmüş oksijen derişimi sıcaklığın azaldığı kış aylarında yükselmiş, sıcaklığın yükseldiği ve tuzluluğun arttığı yaz döneminde ve sonbaharın ilk aylarında azalmıştır. Yüzey sularının nehir etkisinde olmasından dolayı çözünmüş oksijen derişimi dip sularına göre yüksektir. Nehirağzından yukarı doğru gidildikçe çözünmüş oksijen derişimi artmıştır.

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesinde zooplanktonda Rotifera'dan 22, Cladocera'dan 11, Copepoda'dan 32, Cnidaria, Foraminifera, Tintinida, Cirripedia, Bivalvia, Polychaeta, Chaetognatha, Decapoda, Ostracoda, İhtiyoplankton'ndan 1'er olmak üzere toplam 75 takson belirlenmiştir.

Kopepodlar yıl boyu zooplanktonun baskın kümesi olmuş, ocak ve şubat ayında toplam zooplanktonun sırasıyla % 64 ve % 61'ini yaz döneminde bölgede tuzluluğun artmasıyla toplam zooplanktonun temmuz'da % 81'ini, ağustos'ta % 82'sini, eylül'de % 81'ini ve ekim'de % 79'unu oluşturduğu belirlenmiştir. Vieira et al. (2003) toplam zooplanktonun % 60'ını, Khalil and El-Rahman (1997) % 75'ini, Naumenko, (2009) % 56'sını kopepodların oluşturduğu belirlemiştir.

Manavgat'da 32 kopepod türü belirlenmiştir. Sözü edilen bölgenin 2., 3. ve 4. örnek yerleri deniz ve nehrin birleşme noktası olup acısu özelliği gösteren bölgedir. Bu örnek yerlerinde genel olarak görülen türler *Oithona nana*, *Clausocalanus arcuicornis*, *Clausocalanus furcatus*, *Acartia discaudata*, *Calocalanus styliremis*, *Pleuromamma gracilis*, *Temora stylifera*, *Centropages furcatus*, *Centropages kroyeri*, *Coryceus sp.*, *Euterpina acutifrons*, *Paracalanus parvus*, *Oithona nana*, *Oithona plumifera*, *Oncaea mediterranea*, *Oncaea minuta* türleridir.

Kalanoid kopepodlardan Paracalanidae, Clausocalanidae and Temoridae tür sayısı ve biomas bakımından kalanoid kopepodlar arasında baskın familyalardır. (İşinibilir et al., 2008, Miyashita et al, 2009). Yapılan bu çalışmada Clausocalanus cinsine ait iki tür (*Clausocalanus arcuicornis*, *C. furcatus*). Belirlenmiştir. *Clausocalanus arcuicornis* en yüksek birey sayısına sahip takson olmuştur. (Temmuz, 4030 org/m³). *Paracalanus parvus* Temmuz ayı'nda 3980 org/m³ olarak belirlenmiştir.

Victoria Körfezi östarin sistemi (Güneydoğu Brezilya) 'nde *Paracalanus parvus*, *Paracalanus quasimodo* ve *Parvocalanus crassirostris* nehirağzı bölgesinde daha alt kısımlarında daha çok yoğunluğa ulaşmıştır (Sterza and Fernandez, 2006). Manavgat

nehirağzı bölgelerinde 5 istasyondan alınan örneklemelerde *Paracalanus* cinsine ait toplam 3 tür (*Paracalanus parvus*, *P. aculeatus*, *P. nanus*) tespit edilmiştir. Özellikle *P. parvus* türü örihalin karakterde bir tür olup nehirağzı bölgesinde baskın olarak saptanmıştır. *Paracalanus* cinsine ait türlere yıl boyu rastlanılmıştır.

Oithona cinsine ait türlerin tipik östrain bölge türleri olduğu, nehirağzı bölgesinin yukarı kesimlerini daha çok yeğledikleri bilinmektedir (Vieira et al., 2003, Sterza and Fernandez, 2006). Çalışmamızda *Oithona* cinsine ait 3 tür (*Oithona helgolandica*, *Oithona nana* ve *Oithona plumifera*) tespit edilmiştir. Bu türler yukarıdaki çalışmalarda belirtilen nehirağzı bölgesine özelleşmiş olan *Oithona* cinsine ait türlerdir. Manavgat nehirağzı bölgesinde 2., 3. ve 4. örnek yerlerinde *Oithona nana* ve *Oithona plumifera* baskın taksonlar olarak görülürken *Oithona helgolandica* türüne sadece 1. istasyonda rastlanılmıştır.

Manavgat Nehri nehirağzı bölgesinde 22 rotifer türü tespit edilmiş *Euchlanis dilatata*, *Colurella uncinata*, *Lepadella ovalis*, *Keratella cochlearis*, *Keratella quadrata*, *Asplanchna priodonta*, *Cephalodella gibba*, *Polyarthra vulgaris*, *Testudinella patina* yaygın olarak gözlenirken *Keratella cochlearis* baskın takson olarak tespit edilmiştir.

Araştırmamızda bulunan türler daha önce yapılan benzer çalışmalarda bulunan nehir ve nehirağzı bölgelerine uyum yapmış türlerdendir (Crump and Baross, 1996; Holst et al., 1998). Nehirağzıda yüksek yoğunluklara ulaşan türler tuzluluk değişimine hoşgörüsü geniş olan (örük) rotifer türleridir. Manavgat bölgesinde en yüksek yoğunluğa ulaşan *Keratella cochlearis*'in tuzlulukla ilişkisinin olumlu yönde olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (Holst et al., 1998; Azemar et al., 2010).

Manavgat nehirağzı bölgesinde 5 istasyondan alınan örneklerde *Ceriodaphnia pulchella*, *Daphnia longispina*, *Daphnia cucullata*, *Diaphanosoma sp.*, *Moina micrura*, *Chydorus sphaericus*, *Bosmina longirostris*, *Bosmina fatalis*, *Penilia avirostris*, *Evadne spinifera*, *E. nordmanni* ve *Podon polyphemoides* olmak üzere toplam 12 tür belirlenmiştir. *Ceriodaphnia pulchella*, *Daphnia longispina*, *Daphnia cucullata*, *Diaphanosoma sp.*, *Moina micrura*, *Chydorus sphaericus*, *Bosmina fatalis* ve *Alona sp.* türleri daha çok tuzluluğun düşük olduğu istasyonlarda görülürken, *Bosmina longirostris*, *Evadne spinifera*, *E. nordmanni* ve *Penilia avirostris* 2,3 ve 4. istasyonlarda, *Podon polyphemoides* ise sadece deniz bölgesinde (1. istasyonda) tespit edilmiştir. Nehirağzı bölgesinde bulunan türler nehirağzı bölgesinde yapılan çalışmalarda tanımlanan örihalin karakterdeki türlerdir (Naumenko, 2009 (Sautour et al., 1996). (Puelles et al., 2004) Chicharo et al., 2001).

TEŞEKKÜRLER

Çalışmamıza 1730-D-07 nolu proje ile destek veren Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Başkanlığına teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- Azemar, F., Maris, T., Mialet, B., Segers H., Damme S.F., Meire, P., Tackx, M., 2010. Rotifers in the Schelde Estuary (Belgium): A test of taxonomic relevance. *Journal of Plankton Research*, 32 (7), 981–997 p.
- Bat, L., Sahin, F., Ustun, F., Kideys, A., Satilmis, H.H. (2007). The Qualitative and Quantitative Distribution in Phytoplankton and Zooplankton of Southern Black Sea of Cape Sinop, Turkey in 1999-2000. *IEEE Oceans '07, IEEE Catalogue Number: 07EX1527C; ISBN Number: 1-4244-0635-8; Library on Congress: 2006932314*, 6 p. Doi: 10.1109/Oceanse.2007.4302224.
- Bayly, I.A.E., 1972. The Non-Marine Centropagidae (Copepod: Calanoida) of the World. SPB Academic Publishing, Netherlands. 1-30 p.
- Baytut, O., Gönülol, A., Koray, T., 2010. Temporal Variations of Phytoplankton in Relation to Eutrophication in Samsun Bay, southern Black Sea. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 10: 363-372.
- Bekleyen, A., 1997. Devegeçidi ve Göksu Barajlarında Dağılışı Gösteren Zooplankton Grupları Üzerinde Sistematik ve Ekolojik Çalışmalar. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Diyarbakır.
- Boltovskoy, D., 1999-a. South Atlantic Zooplankton Vol:1. Backhuys Publishers, Leiden. 870-1705p.
- Boltovskoy, D., 1999-b. South Atlantic Zooplankton Vol:2. Backhuys Publishers, Leiden. 1-870p.
- Boxshall, G.A., Halsey, S.H., 2004 a. An introduction to Copepod Diversity. Part I, The Ray Society Instituted. London, 1-419 p.
- Boxshall, G.A., Halsey, S.H., 2004 b. An introduction to Copepod Diversity. Part II, The Ray Society Instituted. London, 420-966 p.
- Bradford-Grieve, J. M., 1999. The Marine Fauna of New Zealand: Pelagic Calanoid Copepoda, National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), 268 p..
- Brodskii, K. A., 1950. Calanoida of the Far Eastern Seas and Polar Basin of the USSR. Keys to the Fauna of the USSR. Zoologi. Institut of the Academy of Sciences of the USSR, 35, 1–440 p.
- Chicharo, M. A., Chicharo, L. M., Galvao, H., Barbosa, A., Marques, M. H., Andrade, J. P., Esteves, E., Miguel, C., Gouveia, I., 2001. Status of the Guadiana Estuary (south Portugal) during 1996-1998: An Ecohydrological approach *Aquatic Ecosystem Health & Management* 4(1), 73 – 89 p.
- Crump, B.C., Baross, J.A., 1996. Particle-attached bacteria and heterotrophic plankton associated with the Columbia River estuarine turbidity maxima. *Marine Ecology Progress Series*. Vol. 138: 265-213.1
- Dönmez, A., 1998. İskenderun Körfezi'nin Botaş (Yumurtalık) ve Arsuz (İskenderun) Arası Kıyı Alanında Copepoda ve Cladocera (Crustacea) Gruplarına Ait Zooplanktonik Organizmaların Dikey Dağılımı ve Mevsimsel Değişimi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana.
- Dussart, B.H., Defaye, D., 2001. Introduction to the Copepoda. 2th edition, Backhuys Publisher, Leiden. 336 p.
- Edmondson, W. T., 1959-a. Rotifera: Freshwater Biology. 2nd John Wiley & Sons Inc., 420-494 pp., New York.

- Edmondson, W. T., 1959-b. Cladocera: Freshwater Biology. 2nd JohnWiley&Sons Inc., 587-656 pp., New York.
- Edmondson, W. T., 1959-c. Free-Living Copepoda: Freshwater Biology. 2nd JohnWiley&Sons Inc., 735-861 pp., New York.
- Einsle, V., 1996. Copepoda: Cyclopoida Genera Cyclops, Megacyclops, Acanthacyclops. Coord. Edit: Dumont, H. J., Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing bv.
- Elster, H.J., Ohle, W., 1974. Plankton Rotifer Biology and Taxonomy. Chapter 'Die Rotatorien' Stuttgart.
- Erdoğan, Ö. 2011. İki Nehirağzı Bölgesinde (Köprüçay ve Manavgat Nehirleri) Zooplanktonun Taksonomik ve Ekolojik Yönden Araştırılması. T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Doktora Tezi Eğirdir/ISPARTA.
- Frost, B., Fleminger, A. 1968. A revision of the genus *Clausocalanus* (Copepoda: Calanopoda) with remarks on distributional patterns in diagnostic characters. Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography 12, 1-235 p.
- Grice, G.D., 1962. Calanoid copepods from Equatorial waters of the Pacific Ocean. Fishery Bulletin, 61:1072, 171-246 p.
- Harris, R.P., Wiebe, P.H., Lenz, J., Skjoldal, H.R., Huntley, M., 2000. Zooplankton Methodology Manual. Academic Press. 683 p.
- Holst, H., Zimmermann, H., Kausch, H., Koste, W., 1998. Temporal and spatial dynamics of planktonic Rotifers in the Elbe Estuary during Spring. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 47, 261-273 p.
- Isinibilir, M., Kideys, A. E., Tarkan, A.N., Yilmaz, I.N. (2008). Annual cycle of zooplankton abundance and species composition in Izmit Bay (the northeastern Marmara Sea). *Estuaries, Coastal and Shelf Science*, 78 (2008), 739-747 pp.
- Kasturirangan, L. R., 1963. A key for the Identification of the more common planktonic Copepoda of Indian Coastal Waters. Council of Scientific- Industrial Research, New Delhi, 2, 2-87 p.
- Khalil M.T., El-Rahman., N.S.A., 1997. Abundance and diversity of surface zooplankton in the Gulf of Aqaba, Red Sea, Egypt. *Journal of Plankton Research* 9 (7): 927-936.
- Kocataş, A., 2006. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:51 Ders Kitabı Dizini No:20 Bornova/İZMİR.
- Koste, W., 1978-a Rotatoria. Überordnung Monogononta. Die Rädertiere Mitteleuropas, I. Textband, p. 670, II. Tafelband, 670 p., Berlin.
- Koste, W., 1978-b. Rotatoria. Überordnung Die Rädertiere Mitteleuropas II. Tafelband, 235 p., Berlin.
- Küçük, F., 1997. Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi Eğirdir/ISPARTA.
- Mazzocchi, M.G., Zagami, G., Ianora, A., Guglielmo, L., Crescenti, N., Hure, J., 1995. Atlas of Marine Zooplankton, Straits of Magellan. Springer-Verlag Berlin. 652p.
- Miyashita, L.K., Junior, M.M., Lopes, R.M., 2009. Estuarine and oceanic influences on Copepod abundance and production of a subtropical coastal area. *Journal of Plankton Research* 31 (8): 815-826 p.

- Naumenko, E.N., 2009. Zooplankton in different types of estuaries (using Curonian and Vistula Estuaries as an Example). *Inland Water Biology*, 2009, 2 (1):72–81 p.
- Newel, G.E., Newel, R.C., 1977. *Marine Plankton, A Practical Guide*. Hutchinson Pisces Conservation Ltd, London. 244 p.
- Özel, T., 1992. *Planktonoloji*. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No: 145. Bornova/İzmir.
- Özel, İ., 2003. *Planktonoloji II. Denizel Zooplankton*. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:49. Bornova-İzmir.
- Palomares, R., Suarez-Morales, E., Hernandez-Trujillo, S., 1998. *Catalogo de los Copepodos (Crustacea) Pelagicos del Pacifico Mexicano*, Impreso y Hecho en Mexico, 352 p.
- Perry, R., 2003. *A Guide to the Marine Plankton of Southern California*, 3 rd. edition. Ucla Ocean Globe, 1-23 p.
- Pontin, R.M., 1978. *A Key to British Freshwater Planktonic Rotifera*. Freshwater Association Scient. Publ. No:38, 178 p., UK.
- Puelles, M.L.F., Valencia, J., Jansa, J., Morillas, A., 2004. Hydrographical characteristics and zooplankton distribution in the Mallorca channel (Western Mediterranean): spring 2001. *ICES Journal of Marine Science*, 61: 654-666 p.
- Rose, M., 1933. *Copepodes Pelagiques*. Fauna du France, 26,: 1-374 p.
- Rutner- Kolisko, A., 1974. *Plankton Rotifers: Biology and Taxonomy*. Vol. XXVI, Part 1, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 146 p., Stuttgart.
- Sautour, B., Artigas, F., Herbland, A., Laborde, P. 1996. Zooplankton grazing impact in the plume of dilution of the Gironde estuary (France) prior to the spring bloom. *Journal of Plankton Research*, 18 (6): 835-853.
- Sever, M.T., Mavili, S., 2002. İzmir Körfezi (Ege Denizi)'nde Corycaidae (Copepoda) Familyası Türlerinin Dağılımı Üzerine İlk Gözlemler. *Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 227-232 p.*
- Smirnov, N, N., 1996. Cladocera: The Chydorinae and Syciinae (Chydoridae) of the World. *Coor. Edit: Dumont, H. J., Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World*. SPB Ac. Publ. bv.
- Sterza, J.M., Fernandez L.L., 2006. Zooplankton community of the Vitória Bay estuarine system (Southeastern Brazil). *Characterization during a three-year study*. *Braz. Journal Oceanogr.* 54 : 2-3
- Tregouboff, G., Rose, M., 1957. *Manuel De Planctonologie Mediterranee*. Cent. Nati. Dela Res. Scient. 15, Anotole-France, 107-123 p.
- Vieira, L., Azeiteiro U., Re, p., Pastorinho, R., 2003. Marques, J.C., Morgado, F., Zooplankton distribution in a temperate estuary (Mondego estuary southern arm: Western Portugal). *Acta Oecologica* 24: 163–173 p.
- Zununi, T., 2006. *Clausocalanus and Paracalanus identification and species distribution in the Mediterranean Sea*. *Crustacean Zooplankton Taxonomic Workshop, Section 6*.