

## PAPER DETAILS

TITLE: The micro determination of residual methyl bromide in the fumigated pistachio.

AUTHORS: J KAYA

PAGES: 0-0

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/40900>

ANKARA ZİRAİ MÜCADELE İLÄÇ VE ALETLERİ ENSTİTÜSÜ  
ÇALIŞMALARINDAN

M E T H Y L   B R O M İ D E   İ L E FÜMİGE EDİLEN  
ANTEP FİSTİKLARINDA BAKİYE TAYİNİ.

Jülide KAYA  
Baş Asistan

**A**dana Ziraat Mücadele Enstitüsünde 1957 senesi Mayıs ayında P l o d i a I n t e r p u n k t e l l a (Hb) isimli zararlıya karşı Antep fistıkları m e t h y l b r o m i d e ile muhtelif şartlarda fümige edildiğinde fistıklarda kalacak bakiyenin, insan sağlığı bakımından, ne kadar zaman sonra yenmesine müsaade edileceği hususu araştırılmış ve bir sıra bakiye tahlilleri yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

O zamanki kimya lâbratuvari şartlarında tatbik edilebilecek bir metod olarak Amerikada cevizlerdeki bakiye tayininde tatbik edilmiş olan DUDLEY (1939) metodu seçilmiştir.

Cedvellerde tarihleri gösterilen saatlerde yapılan her ilâçlamadan 24 saat sonra fistık meyvelerindeki m e t h y l b r o m i d e absorbsyonunu tespit etmek için elli gramlık ikişer numune, kabukları soyulup küçük parçalara ayrılmak suretiyle KOH li alkole alınıp şişelerin ağızları parafinlenerek tahlile, İlâç Lâbratuvarında devam etmek üzere ambalajlanmıştır.

Her ilâçlamaya (dozu ilâçlamayı yapan elemanda mahfuz olmak üzere) bir numara verilerek fistık numuneleri cedvellerde gösterilmiş olan zamanlarda tahlilleri yapmak üzere kese kâğıtlara alınıp numaralanmış, ilâçlanılmış sıftıklardan da kör deneme yapmak üzere numune alınmış, tahlilleri yapmak üzere İlâç Tahlil Lâbratuvarına getirilmiştir.

İki seri tahlil neticeleri alınınca ilâçlama numaralarının tekabül ettiği dozlar Adana Ziraat Mücadele Enstitüsünden temin edilmiştir.

Metod; m e t h y l b r o m i d e deki b r o m ' u n KOH la b r o m ü r halinde tespit edilip, k r o m a t halindeki k r o m ' u n yükseltgen tesiri ile serbest hale geçirilerek tayinine dayanmaktadır.

50 şer gramlık fistık numuneleri kabukları soyuluktan sonra ufak parçalara bölünerek % 95 lik alkoldeki % 1 lik KOH mahlülü ile muamele edilmek suretiyle absorbe edilmiş olan m e t h y l b r o m i d e tespit edilmiştir. Sonra fistık meyvaları 300 ml. lik porselen kapsüle nakledilmiştir. Kap iki defa su ve bir defa alkolle yıkanmıştır. Kapsül su banyosu üzerinde kuruluğa kadar bırakılmıştır.

Kurumuş olan meyvalar fırının 300 ml lik kapsülleri alamamasından hacimlerinin azaltılması gayesi ile bunzen beki üzerinde yakılıp, bakiye ufak kapsüllere nakledilerek fırında 500-550°C de kül edilmiştir. Kapsül soğuyunca 50 ml sıcak su ile alınıp Watman No: 42 süzgeç kâğıdından süzülmüştür. Kül ve süzgeç kâğıdı sıcak su ile yıkandıktan sonra kurutulup yeniden yakılmıştır. Soğutulduktan sonra 4-5 ml 2N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ilâve edilmiştir. Karışım ıslatılmış süzgeç kâğıdı üzerinden boşaltılıp, süzüntü ilk süzüntü ile birleştirilmiştir. Bir ufak KOH parçası ilâve edilerek vasat alkali yapılmıştır. Kuruluğa kadar su banyosu üzerinde buharlaştırılmıştır. 25 ml H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1400 ml H<sub>2</sub>O+650 ml kesif H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) mahlülü ilâve edilmiştir. Elde edilen karışım 250 ml lik bir yıkama şişesine alınmıştır. Sonra 75 ml doymuş p o t a s y u m b i k r o m a t mahlülü ilâve edilip sıra ile her biri 50 ml % 2 lik KI mahlülü ihtiyaca eden iki yıkama şişesi ile birleştirilmiştir. Numuneden evvel içinden gelecek havayı temizlemek gayesi ile sıra ile kesif KOH ve H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ihtiyaca eden iki yıkama şişesi bağlanıp sistem su trompuna bağlanmıştır. Bir saat hava habbeleri sayılabilcek hızda hava geçirilmiştir. Bir saat sonunda KI çözeltilerini ihtiyaca eden yıkama şişeleri 500 ml lik bir erlene yıkılmıştır. 2 ml kesif HCl ilâve edilerek aşağı çıkan i y o t endikatör olarak nişasta çözeltisi kullanmak suretiyle 0.01 N NA<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ile titre edilmiştir.

Metodda yükseltgen olarak CrO<sub>3</sub> çözeltisi (200 g CrO<sub>3</sub> + 1400 ml H<sub>2</sub>O + 600 ml kesif H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) kullanılması kaytılı olduğu halde temin edilemediği için yerine doymuş p o t a s y u m b i k r o m a t çözeltisi kullanılmıştır. P o t a s y u m b i k r o m a t'ın erirliği asitli vasatta k r o m t r i o k - s i d e nazaran az olduğu için numuneye ilâve edilmesi icap eden miktar daha seyreltilik olarak ilâve edilmiştir. (25 ml yerine 75 ml olarak) Bu sebepten de hava geçirme müddeti yani yükseltmeye müddeti bir saate çıkarılmıştır.

Aynı zamanda saf s ü l f i r i k a s i t temin edilemediği için teknik sülfirik asitle hazırlanan bu konsantrasyondaki yükseltgen çözeltisinin tesiri bir saat müddetle bilinen KBr mahlüllerile denendiğinde elde edilen faktör nazarı itibare alınarak numunelerdeki Br miktarı hesaplanmıştır. Bu Br miktarından da tekabül ettiği m e t h y l b r o m i d e miktarına geçilmiştir. Ayrıca ilâçlanmamış fistık meyvaları ile de çalışılmış kör deneme yapılmıştır.

Neticeler iki cedvel halinde gösterilmiştir.

Cedvellerin tetkikinde görülen sapmalara sebep yani beklenen neticelerin alınmaması fistıkların ihtiyac etiği yağ miktarlarının muhtelif olabileceği ve bu sebepten de absorbe edebileceği methyl bromide miktarlarının farklı olabileceği düşünülmüştür. Bazı tekerrürler arasında da farkların görülmESİ bu kanaatı kuvvetlendirmiştir.

Amerika Birleşik Devletlerince muhtelif gıda maddelerinde müsaade edilen methyl bromide bakiye miktarı 5-75 ppm arasında değişmektedir, (HANNA 1958).

Cedvellerde, sapmalar nazarı itibare alınmazsa, ortalama olarak ilâçlama- dan yedi gün sonra Amerika Birleşik Devletlerince müsaade edilen hudutlar içine girildiği görülmektedir.

Cedvellerdeki ilaçlama müddeti, doz, fümigatuvar içindeki hararet dereceleri ve rutubet süyunları Adana Ziraat Mücadele Enstitüsü mütehassislerinden Mehmet Ali AMBAROĞLU'na aittir. Bu çalışmayı yapmama vesile oldukları için Adana Ziraat Mücadele Enstitüsüne teşekkür etmeyi borç bilirim.

Ayrıca Dudley metodunu temin eden Doçent Dr. Zeliha DÜZGÜNEŞ'e de teşekkür ederim.

## THE MICRO DETERMINATION OF RESIDUAL METHYL BROMIDE IN THE FUMIGATED PISTACHIO

### (Summary):

In 1957, some fumigation experiments have been carried out on the dried fruits of pistachio with methyl bromide at the rate of 32,4 and 64,8 gr per cubic meter under the atmospheric and vacuum conditions, against *Plodia interpunctella*.

The residue of methyl bromide in the treated dried fruits was determined by DUDLEY's method used for the residue on walnuts in U. S. A., with some modification.

$K_2Cr_2O_7$  solution was used as an oxidizing agent instead of  $CrO_3$  originally used in the method. As a result  $K_2Cr_2O_7$  dissolves in water less than the other, the oxidation time was increased from 25 minutes to 1 hour because of weak solution of the oxidizing agent.

The results obtained are shown in two tables above.

The residue of  $CH_3Br$  found was between 0.66-12.80 mgr in 100 g of the pistachio fruit.

### Literatur:

- Dudley, H. C., ... ... 1939. Bromide content of fruits and vegetables following fumigation with methyl bromide. Ind. Eng. Chem., 11: 259-261. Reprinted from Jour Econ. Entomology 44, (3): 384.
- Lester W. Hanna, ... ... 1958. Handbook of Agricultural Chemicals. Oregon, U. S. A. 493.

### C e d v e l : I

Antep fistıklarında zararlı *Plodia Interpunctella (Hb)* ye karşı Metil Bromidle  
Vakumsuz seyyar Fümügatuvara yapılan ilaçlamadan muayyen zaman sonra  
 alınan numunelerde kalan bakiye miktarlarını gösterir cedvel.

Numune No.	İlaçlama tarihi	Giriş Çıkış	saatleri	Müddet Saat	Dose gr/M <sup>3</sup>	24 saat	100 gr. kabulksuz fistıkta kalan bakiye miktarları mgr. CH <sub>3</sub> Br.			hararet derecesi Azami C°	Fümügatuvar işinde Asgarî C°	Rutubet
							7 gün	45 gün	3 ay			
9.5.957	15.25	17.25	2	32,4	0,66	1.38	—	1.83	36	30	55—56	
16 12.5.957	15.15	17.15	2	32,4	1.83	1.94	1.12	1.06	41	34	42—44	
5 10.5.957	8.10	16.10	8	32,4	5,97	6,32	4,20	5,97	41	20	80—45	
14 12.5.957	4.50	12.50	8	32,4	4,27	3,94	4,20	—	39	18	82—45	
9 11.5.957	11.—	13.—	2	64,8	4,63	3,46	2,95	4,53	41	21	44—42	
15 12.5.957	13.—	15.—	2	64,8	3,40	2,22	2,32	2,96	41	40	43—42	
10 13.5.957	13.30	21.30	8	64,8	11.68	7,41	8,26	12,80	20	20	42—57	
17 13.5.957	8.—	16.—	8	64,4	11.37	8,95	—	9,77	41	22	80—55	

## C e d v e l : II

Antep fistıklarında zararlı *Plodia interpunctella* (Hb) ye karşı Metil Bromidle  
Vakumlu seyyar Fümügatuvarda yapılan ilaçlamadan muayyen zaman sonra  
alınan numunelerde kalan bakiye miktarlarını gösterir cedvel.

Numune No.	İlaçlama tarihi	Giriş Çıkış	saatleri	Müddet Saat	Doz gr/M <sup>3</sup>	100 gr. kabuksuz fistıkta kalan bakiye miktarları mgr. CH <sub>3</sub> Br.			Fümügatuvardan içinde hararet derecesi		
						24 saat	7 gün	45 gün	3 ay	C <sup>o</sup>	Rutubet
1	9.5.957	14.54	15.54	1	32.4	0.86	0.70	0.85	1.20	30	27
11	11.5.957	13.35	14.35	1	32.4	1.36	1.52	0.94	1.14	29	42—40
6	10.5.957	11.40	13.40	2	32.4	2.16	2.63	2.28	2.32	26.5	20
4	11.5.957	10.40	12.40	2	32.4	1.76	1.22	1.43	1.81	33	27,5
7	10.5.957	14.22	15.22	1	64.8	2.38	2.45	1.56	2.49	26	46—46
12	11.5.957	14.35	15.35	1	64.8	3.22	2.20	1.85	2.69	30	30
8	10.5.957	15.30	17.30	2	64.8	2.62	2.31	2.94	2.27	33.5	26,5
13	11.5.957	15.45	17.45	2	64.8	3.61	2.61	1.47	4.00	28	38—40