

PAPER DETAILS

TITLE: KARADENİZ BÖLGESİNDE 1961 YILINDA FINDIK KURDU`NA MÜESSİR OLMİYAN
HEPTACHLOR`LAR ÜZERİNDE KİMYEVÎ; FİZİKÎ BİYOLOJİK ARASTIRMALAR

AUTHORS: E WINFRID,S ÖZTÜRK,G SCHMIDT

PAGES: 114-123

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/41008>

**KARADENİZ BÖLGESİNDE 1961 YILINDA FINDIK KURDU'NA
MÜESSİR OLMİYAN HEPTACHLOR'LAR ÜZERİNDE KİMYEVİ, FİZİKİ
BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR (*)**

Winfried EBING

Saffet ÖZTÜRK

Günther SCHMIDT

GİRİŞ.

Karadeniz bölgesinde fındık kurduna karşı senelerdenberi muvaffakiyetle kullanılan Koruma Firmasına ait % 2,5 toz Heptachlor ilâcının 1961 yılı mücadelesinde müessir olmadığı ileri sürülmüştür. Bu durumun ilâçlarla ilgili sebeplerini araştırmak için Ankara Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsü tarafından aşağıda adı geçen (*) Enstitüye gönderilen nümuneler üzerinde mukayeseli çalışmalar yapılmıştır.

KİMYEVİ TETKİK

Ziraî Mücadele İlâçları Araştırma Enstitüsünün Analitik Kimya Lâboratuvarına bağlı fiziko - kimya kısmında mevzuubahis ilâca ait 5 nümune-
de organik madde miktarı araştırılmıştır. Bunun için insektizid toz ilâçlar için mutad tecrübe olan acetonlu ekstraksiyonla infrarot - spektrometrik tayin tekniği kullanılmıştır.

(*) Bahis konusu ilâca ait 5 parti nümunelerin tetkiki Berlin - Dahlem'de bulunan Biologische Bundesanstalt für Land - und Forstwirtschaft'a bağlı Ziraî Mücadele İlâçları Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın RR. Dr. W. Fischer'den rica edilmiş ve Kimyevî, Fizikî ve Biolojik tetkikler Dr. W. Ebing, Saffet Öztürk ve Dr. G. Schmidt tarafından yapılmıştır.

Bu vesile ile Enstitü Müdürü RR. Dr. W. Fischer'e ve tetkikleri yapan araştırmacılara teşekkür ederiz.

Aynı mevzu üzerinde Ankara Ziraî Mücadele İlâç ve Aletleri Enstitüsünde yapılan çalışma Bitki Koruma Bülteni Cilt 3, No 1, Sayfa 21-29 da neşredilmiştir.

Bu arařtırmalara g re bu 5 n mune arasında organik madde miktarı bakımından kalitatif hi bir fark yoktur. N muneler teknik 1,4,5,6,7,8,8 - Heptachlor - 4,7 - endomethylen - 3 α , 4, 7, 7 α , - tetra hydro - indense sahiptirler. Kantitatif bakımdan heptachlor muhtevasında metodun (% $\pm$ 0,3) hata hududunun dıřında  ok az fark vardır. ř yleki:

N�mune	Teknik Madde nisbeti
I	% 2,2
II	% 2,7
III	% 2,6
IV	% 2,5
V	% 2,9

Ekstraksiyon esnasında Alman im alatı toz il lara nazaran anorganik dolgu maddelerinde b t n n munelerde daha yavař bir sedimentasyon g r lm řt r. Bu durum n munelerde g r len dolgu maddelerinin  ok k   k zerre b y kl klerine sahip olmasından ileri gelmektedir.

H l sa olarak b t n n munelerin kimyevi terkip bakımından aynı de erde oldu u s ylenebilir.

F ZİKİ TETKİK.

Toz il ların biyolojik aktivitesine tesir eden fiziki  zelliklerden en m himleri incelik derecesile yapıřma ve tozuma kabiliyetleri oldu undan adı ge en 5 n mune  zerinde bu  zellikler tayin edilmiřtir. Ayrıca zerre b y kl  , il cın bitki  zerinde m tecanis da ılıp da ılmaması ve zerre řekli gibi 3 fiziki  zelli i bir arada tesbit edebilen ve bu hususta fikir verebilen bir metod da tekemm l ettirilerek tatbik edilmiřtir.

 ncelik derecesi:

Bu  zelli in tayin i in Ernst Leitz firmasına ait Mikroprojektor Xb II kullanıldı. Bulunan incelik dereceleri cetvel 1 de g sterilmiřtir.

CETVEL. I
 NCELİK DERECELERİ

N�mune	% zerre b�y�kl�� da�ınımı					
	0-5 μ	6-10 μ	11-20 μ	21-40 μ	41-80 μ	> 80 μ
I	32	35	20	9	3	0,3
II	33	35	20	9	2	0,3
III	31	32	25	9	2	0,1
IV	31	37	22	7	2	0,2
V	41	28	20	9	2	0,1

Yapıřma kabiliyeti :

Nachrichtenbl. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst Braunschweig, 6 (1954), S. 17-23 de bahsedilen ve H. Zeumer tarafından t dil edilen metodla  alıřıldı ve pl kalar M llergase ile tozlandı. Standart talk Luv Superior No. 9976 nın % 50 yapıřkanlı ına g re neticeler kıymetlendirildi. Bulunan de erler ř yledir:

Nümune	Yapışma kabiliyeti
I	Y = 3,7
II	Y = 2,7
III	Y = 1,8
IV	Y = 3,5
V	Y = 2,2

Tozuma kabiliyeti :

R.R. Dr. W. Fischer tarafından (Methodenbuch Band VII, Die Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln, 1951, S.107, Neumann Verlag, Radebeul und Berlin) isimli literatürde bahsedilen metoda göre elde edilen değerler şöyledir.


Nümune	Bakiye
I	Eseri
II	% 0,018
III	% 0,079
IV	% 0,035
V	% 0,025

Zerre büyüklüğü, zerre şekli ve preparatın bitki üzerinde mütecanis dağılması:

Toz Ziraî Mücadele ilaçlarının biyolojik aktivitesinde zerre büyüklüğü, zerre şekli ve aynı zamanda da ilacın yaprak üzerinde yaprağın her yerinde birim sathı aynı miktar ilacın isabet etmesinin, dolayısıyla yaprağın her tarafının ilaçla buluşmasının mühim rolü vardır.


Bu husus düşünülerek ve yukarıda sayılan her 3 özelliği bir arada toplayabilecek ve bize hüküm verdirebilecek bir usulün tatbiki düşünülmüştür. Bunun için Mitteilungen aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin - Dahlem Heft 55 sayfa 121 de bahsi geçen ve aşağıda şekli çizilen Cam fanusun (A) üstüne Lang Welte Glocke (B) tesbit edilmiş ve boruya 25 mg. dan 100 mg. a kadar sıra ile 100, 75, 50, 25 mg. ilaç konarak (C) 1 tamosfer tazyikle tozutulmuştur.

Fanusunun altında tam orta yere yerleştirilen lâm üzerine (D) püskürtmeden itibaren 5 dakika beklenerek preparat zerrelere çökmesi beklenmiş ve sonra lâm alınarak mikroskopun altına konmuş ve mikroskopun oküleri çıkarılarak bir fotoğraf makinesinin objektifi tesbit edilmiş ve daha evvel bir mikrometre ile büyütme nisbeti tesbit edilerek fotoğrafları çekilmiştir. Yapılan ön çalışma neticesinde nümuneler arasında mukayeseye yarıyabilecek en iyi resimlerin ancak 50 mg. preparat tozutulduğu zaman elde edilebileceği kanaatine varılmıştır. Elde edilen fotoğraflardan karelere ayrılarak zerre büyüklüğü tesbit edilebildiği gibi ayrıca fotoğraflar nümuneler arasında zerre şekli ve mütecanis bir dağılma olup olmama hakkında fikir de vermektedir. Mevzuubahis 5 heptachlor nümunesine ait fotoğraflar aşağıdadır. (Şekil : 1-5).




Tesbit edilen fiziki özelliklerin kıymetlendirilmesi:


En fazla incelik derecesine 5 No.lu nümune sahiptir. Bütün 5 nümune-
de de yapışma kabiliyeti çok düşüktür. Nümuneler kendi aralarında yapış-
ma kabiliyetleri bakımından mukayese edildiğinde 3 No.lu nümunenin di-
ğerlerine nazaran daha da az yapışma kabiliyetine sahip olduğu görülür.
Bütün nümunelerin tozuma kabiliyetleri çok iyidir. Ancak 3 No.lu nümune-
nin diğerlerine nazaran fazla bakiye ihtiva ettiği görülürse de bu değer me-
todun tanıdığı azami % 3 değerın çok aşağısındadır. Zerre şekli ve müteca-
nis dağılıp dağılmama hususunda da nümuneler arasında bâriz fark yoktur.




Şekil : 1 — Nümune I in mikroskopta görünüşü (1 mm = 20 mikron)




Şekil : 2 — Nümune II nin makroskopta görünüşü (1 mm = 20 mikron)



Şekil : 3 — Nümune III ün mikroskopta görünüşü (1 mm = 20 mikron)



Şekil : 4 — Nümune IV ün mikroskopta görünüşü (1 mm = 20 mikron)



Şekil : 5 — Nümune V in mikroskopta görünüşü (1 mm = 20 mikron)

BİYOLOJİK TETKİK:

- 1) *Calandra granaria* : Denemeler petri kutularında yapılmış ve muhtelif dozlar kullanılmıştır.
Konroller
a) 24 saat ve daha uzun zaman sonra yapılmıştır.
b) 1/2-1 saat gibi kısa bir müddet ilaçlanmış petri kutularında böcekler tutulduktan sonra ilaçlanmamış petrilere alınmıştır.
Calandra granaria : İlaçlanmış hububat üretme şişelerine alınmış ve *calandra granaria* ile (200 g + 100 hayvan) temas ettirilmiştir. (Üretim tecrübesi)
- 2) *Drosophila* : Aceton ekstraktı cam kaplara bulaştırılmış ve *drosophila* ile muamele edilmiştir. (Gıda olarak şeker + su).
- 3) *Lebistes* : Bir litre sudaki aceton ekstraktı her kapta iki lebistes olmak üzere denenmiş ve muhtelif dozlar tatbik edilmiştir.

Bütün deneme şekillerinde deneme hayvanlarına tesir aynı olmuştur. Her denemede nümuneler arasında tesirlilik farkı görülmemiştir. Yani bir tesirsizlik hiçbir şekilde tesbit edilememiştir.

Netice ve kanaat :

Türkiye'den gönderilen ve 1961 yılında fındık kurdu mücadelesinde kullanılan 5 nümune üzerinde lâboratuvarlarda yapılan kimyevi, fiziki ve biyolojik araştırmalar neticesinde aralarında bâriz farklar tesbit edilememiştir.

ZUSAMMENFASSUNG

UNTERSUCHUNGEN AN DEN HEPTACHLOR STÄUBEMITTELN, DIE IM JAHRE 1961 AM SCHWARZENMEER IN DER TÜRKEI GEGEN BALANINUS NUCUM UNWIRKSAM WAREN

Chemische Untersuchungen :

In der physikkalisch - chemischen Abteilung des chem.- analytischen Labors im Institut für Pflanzenschutzmittelforschung wurden 5 von Heptachlor Proben auf ihren Gehalt an organisch - chemischen Bestandteilen untersucht. Dabei wurde das hier bei Insektizid - Stäubemitteln übliche Verfahren angewendet, das eine Aceton - Extraktion mit einer Infrarot - spektrometrischen Bestimmungstechnik verbindet.

Nach diesen Untersuchungen weisen die Proben I-V bzgl. der organischen Bestandteile qualitativ keinen Unterschied auf. Die Proben liefern ein Spektrum des technischen 1,4,5,6,7,8,8 - Heptachlor - 4,7 - endomethylen - 3 α , 4,7,7 α - tatrahydro - indens. In quantitativer Hinsicht ergeben sich geringfügige Unterschiede bzgl. des Heptachlorgehaltes, die jedoch nur wenig ausserhalb der Fehlergrenze der Methodik ($\pm 0,3\%$) liegen:

Probe	I	2,2 %
»	II	2,7 %
»	III	2,6 %
»	IV	2,5 %
»	V	2,9 %

Bei den Extraktionen fällt auf, dass die anorganischen Trägerstoffe bei allen Proben durchweg wesentlich langsamer sedimentieren, als das bei den in Deutschland handelsüblichen Stäubemitteln allgemein der Fall ist. Dieser Befund lässt auf eine besonders geringe Korngrösse der bei den Proben verwendeten Trägermaterialien schliessen.

Zusammenfassend sind alle Proben als praktisch gleichwertig anzusehen.

Physikalische untersuchungen:

Bei den 5 Proben wurden Feinheitsgrad, Haftfähigkeit und Verstäubbarkeit bestimmt.

Feinheitgrad :

Die Bestimmung wurde mit Hilfe des Mikroprojektors Xb II der Fa. Ernst Leitz, Wetzlar, durchgeführt.

Probe	Korngrößenverteilung %					
	0-5 μ	6-10 μ	11-20 μ	21-40 μ	41-80 μ	> 80 μ
I	32	35	20	9	3	0,3
II	33	35	20	9	2	0,3
III	31	32	25	9	2	0,1
IV	31	37	22	7	2	0,2
V	41	28	20	9	2	0,1

Haftfähigkeit :

In Abänderung der von H. Zeumer (im Nachrichtenbl. d. Deutsch. Pflanzenschutzd. Braunschweig, 6 (1954), S.17-23) beschriebenen Methode, wurden die Platten mit Hilfe von Müllergaze bestäubt. Die Ergebnisse beziehen sich auf 50 % Haftfähigkeit des Standart - Talkums Luv Superior Nr. 9976.

Probe	I) $y = 3,7$
»	II) $y = 2,7$
»	III) $y = 1,8$
»	IV) $y = 3,5$
»	V) $y = 2,2$

Die Verstäubbarkeit:

Die Werte nach der Methode von R.R. Dr. W. Fisscher (Methodenbuch Band VII, Die Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln, 1951, Neumann Verlag, Radebeul und Berlin) erhalten.

Probe	Rückstand
I	Spur
II	0,018 %
III	0,079 %
IV	0,035 %
V	0,025 %

Bewertung:

Den höchsten Feinheitgrad zeigt Probe 5. Die Haftfähigkeit ist bei allen 5 Proben sehr gering. Den niedrigsten Wert zeigt Probe 3. Die Verstäubbarkeit ist bei allen 5 Proben gut. Der im Vergleich zu den anderen 4 Proben bei Probe 3 festgestellte grosse Rückstand liegt aber weit unter dem noch möglichen Höchstwert von 3 %.

Die 5 untersuchten Proben können diesen Ergebnissen als praktisch gleichwertig angesehen werden.

Biologische untersuchungen :

- 1) Kornkäfer : Petrischalen behandelt. Verschiedene Dosierungen.
Kontrollen
a) Nach 24 Stunden und länger.
b) Nach kurzfristigem Belassen (1/2 - 1Std.) i. der
Schale und umsetzen in unbenhandelte Schalen.
- Kornkäfer : In Zuchgläsern behandeltes Getreide (200 g + 100
Tiere mit Kornkäfern besetzt. (Zuchtversuch)
- 2) Drosophila : Acetonextrakte in Glasgefäßen ausgeschwenkt, mit
Drosophila beschickt. (Zucker + H₂O als Nahrung)
- 3) Guppies : Acetonextrakte in 1 Ltr. Wasser + 2 Guppies je
(Lebistes) Gefäß getestet, Verschiedene Dosierungen wurden
angewendet.

In allen Versuchen ergaben sich keine gesicherten Unterschiede in der Wirkung der Proben, sie waren bei allen Versuchstieren und in sämtlichen Versuchsanlagen gleich wirksam. Ein Versager konnte also nirgends festgestellt werden.

L I T E R A T Ü R

- FISCHER, W., 1951. Methodenbuch Band VII, Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln S. 31 - 33 ve 107
- TRAPPMANN, W., 1937. Mitteilungen aus der Biologischen Reichsanstalt für Land - und Forstwirtschaft Berlin - Dahlem Heft 55, S. 121
- ZEUMER, H., 1954. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienst Braunschweig, 6, 17 - 23