

PAPER DETAILS

TITLE: Uzunçayir Baraj Gölü'ndeki *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nin Üreme Biyolojisi

AUTHORS: Fatih GÜNDÜZ, M Zülfü ÇOBAN, Fahrettin YÜKSEL, Ferhat DEMİROL, Kenan

ALPASLAN, Ahmet ALP

PAGES: 51-57

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418487>

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın Üreme Biyolojisi

Fatih GÜNDÜZ¹ , M. Zülfü ÇOBAN² , Fahrettin YÜKSEL³ , Ferhat DEMİROL¹ ,
Kenan ALPASLAN¹ , Ahmet ALP⁴ 

¹Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ

²Fırat Üniversitesi, Keban Meslek Yüksek Okulu, Keban, Elazığ

³Munzur Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli

⁴Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Kahramanmaraş

✉ : fatih.gunduz@tarim.gov.tr

ÖZET

Çalışmada, sürdürülebilir avcılık stratejilerinin belirlenebilmesi amacıyla, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki *Capoeta trutta*'nın üreme özellikleri araştırılmıştır. Balık örnekleri 2013 yılının Ocak-Aralık ayları arasında farklı ağ göz açıklıklarına (36-100 mm) sahip sade uzatma ağlarıyla aylık olarak yakalanmıştır. Araştırma süresince Uzunçayır Baraj Gölü'nden yakalanan 385 adet *C. trutta* bireyinin 218 adedini (%57.00) erkek, 167 adedini (%43.00) ise dişi bireylerin oluşturduğu ve populasyonun I-XII yaş grupları arasında dağılım gösterdiği saptanmıştır. GSI değerlerinin mayıs ayında maksimuma ulaştığı, sperm ve yumurtalarını mayıs-temmuz ayları arasında bıraktıkları tespit edilmiştir. Yumurta çapları 0.30-1.07 mm arasında değişmiştir. Fekondite-total boy ve fekondite-ağırlık arasındaki ilişkileri açıklayan denklemler sırasıyla; $F=29.708*TL-593.36$ ($N=35$, $r=0.27$), $F=9.6448*W+5488.3$ ($N=35$, $r=0.38$) olarak hesaplanmıştır. *C. trutta* bireylerinin yaş gruplarına göre yumurta veriminin 1362-15428 arasında değiştiği belirlenmiştir. Eşeyssel olgunluk boyu dişi bireylerde 20.77 cm, erkek bireylerde 19.35 cm olarak tespit edilmiştir.

DOI:10.18016/ksudobil.296558

Makale Tarihçesi

Received : 06.03.2017

Accepted : 13.04.2017

Anahtar Kelimeler

Capoeta trutta,
Eşeyssel Olgunluk Boyu,
Uzunçayır Baraj Gölü,
Yumurta Çapı

Araştırma Makalesi

Reproduction Biology of *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) in the Uzunçayır Dam Lake

ABSTRACT

In the study, on the purpose of contribute to sustainable fisheries strategies, the reproductive characteristics of *Capoeta trutta* in Uzunçayır Dam Lake were investigated. The fish samples were caught from Uzunçayır Dam Lake by using gill nets with different mesh sizes (36-100 mm) between January-December 2013. During research period, a total of 385 *C. trutta* samples that were caught from Uzunçayır Dam Lake yielded 167 female (43.00%) and 218 male (57.00%) with an age composition of population varied from I to XII age groups. GSI values reached a maximum in May and rapidly declined after that month, and it can be concluded that *C. trutta* in Uzunçayır Dam Lake deposits its sperms and eggs between May-July. Egg size varied between 0.30-1.07 mm in dimeter. The relationships between fecundity-total length and fecundity-total weight were determined respectively as; $F=29.708*TL-593.36$ ($N=35$, $r=0.27$), $F=9.6448*W+5488.3$ ($N=35$, $r=0.38$). The fecundity of *C. trutta* individuals changed from 1362 to 15428 according to age groups. Sexual maturity length was determined as 20.77 cm and 19.35 cm for female and males, respectively.

Article History

Geliş : 06.03.2017

Kabul : 13.04.2017

Keywords

Capoeta trutta,
Egg Diameter,
Sexual Maturity Length,
Uzunçayır Dam Lake

Research Article

GİRİŞ

Tüm canlılarda olduğu gibi balıklarda da üreme, tür devamlılığını sağlayabilmeleri için yaşamsal öneme sahiptir. Bir balık su kaynağında veya bulunduğu ortamda büyüyüp gelişebilmesine karşın üreme özelliğine sahip değilse o ortama adapte olmuş sayılmamaktadır. Tüm diğer hayvanlar gibi balıklar da genetik olarak üremeye programlanmıştır.

Bir türün üreme başarısı ekolojik koşullara bağlı olarak genetik kapasiteleri tarafından belirlenmektedir ve bu bağlamda her türün kendine özgü üreme stratejisi vardır. Bu nedenlerden dolayı başarılı bir balık üretiminin gerçekleşmesi ve balık yetiştiriciliği açısından türlerin üreme biyolojilerinin belirlenmesi önemlidir (Wang ve ark., 2014). Ayrıca, doğal balık stoklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve balıkçılık yönetim stratejilerinin belirlenmesi için balık populasyonlarının üreme özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Uzunçayır Barajı, Tunceli'de, Munzur Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilmiştir. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 551 m³, normal su kotunda göl hacmi 308 hm³ ve göl alanı 13 km² dir. Baraj 74 MW güç ile yıllık 317 GWh'lik elektrik enerjisi üretmektedir ve bölgenin önemli HES'lerinden birisidir (URL).

Uzunçayır Baraj Gölü'nde 3 familyaya ait (Salmonidae, Cyprinidae ve Nemacheilidae) 12 takson (*Salmo trutta macrostigma* (Dumeril, 1858), *Acanthobrama marmid* Heckel, 1843, *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782), *Alburnus mossulensis* Heckel, 1843, *Barbus lacerta* Heckel, 1843, *Capoeta trutta* (Heckel, 1843), *Capoeta umbla* (Heckel, 1843), *Chondrostoma regium* (Heckel, 1843), *Cyprinus carpio carpio* (Linnaeus, 1758), *Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758), *Oxyzoemacheilus angorae* (Steindachner, 1897), *Paracobitis tigris* (Heckel, 1843)) yaşamaktadır (Çoban ve ark., 2013).

Bu taksonlar içinde sadece sazan (*Cyprinus carpio carpio*) DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda aşıl原因mış olup, diğer taksonların hepsi rezervuarın doğal türüdür.


Capoeta trutta (Heckel, 1843), özellikle Ortadoğu ülkelerinden Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de yaygın olarak dağılım gösteren Cyprinidae familyasına ait bir türdür. Bu türün çeşitli su kaynaklarında yaşayan populasyonları hakkında birçok bilimsel araştırma bulunmaktadır (Polat, 1987; Şen ve ark., 1987; Şevik, 1993; Gül ve ark., 1996; Öztürk ve ark., 1997; Yapalak ve Yüksel 1998; Şevik ve ark., 1998; Yılmaz ve Solak 1999; Çalta ve ark., 2001; Örün ve Erdemli 2002; Özekinci ve ark., 2003; Duman, 2004; Çökmez, 2005; Çalta ve Canpolat 2007; Kalkan, 2008; Çoban ve Düşükcan 2009; Mol ve ark., 2010; Yazıcıoğlu ve Yılmaz 2011; Kurt Kaya ve ark., 2013; Gündüz ve ark., 2014).

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki *Capoeta trutta*'nın üreme biyolojisine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile yeni bir baraj gölü olan Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki ekonomik öneme sahip *C. trutta*

populasyonunun üreme özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT

Çalışma, Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında, Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli)'nde belirlenen 6 istasyonda yürütülmüştür (Şekil 1). Balık örneklemeleri, ağ göz açıklığı 36 ile 100 mm arasında değişen monofilament sade uzatma ağılarıyla, aylık olarak gerçekleştirilmiştir. Avcılık operasyonlarında toplam 385 adet *Capoeta trutta* bireyi yakalanmış ve soğuk zinciri kullanılarak incelenmek üzere laboratuvara getirilmiştir.



Şekil 1. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki araştırma istasyonları

Capoeta trutta örneklerinin total boyu (TB) 1 mm taksimatlı ölçüm tahtasında, vücut ağırlıkları (VA) ve gonat ağırlıkları (GA) ise 0.1 g hassasiyetindeki dijital terazide belirlenmiştir. Cinsiyet tespiti, gonatların görsel olarak muayenesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Yaş tahminleri dorsal yüzgeç ışıını kullanılarak yapılmıştır (Polat 1986; Öztürk ve ark., 1997).

Üreme döneminin tespit edilmesi amacıyla aşağıdaki formüller kullanılarak aylık periyotlarda gonadosomatik indeks değerleri (GSİ) ve kondisyon faktörleri (KF) hesaplanmıştır (Avşar, 1998).

$$GSİ = [GA/(VA-GA)] \times 100$$

$$KF = [(VA-GA)/TB^3] \times 100$$

Yumurta çapları oküler mikrometre ile [(uzun eksen uzunluğu+kısa eksen uzunluğu)/2] formülü kullanılarak ölçülmüştür (Çelik ve Bircan, 2004).

Fekondite, yumurtlama evresindeki dişi bireyler kullanılarak tahmin edilmiştir. Mutlak fekondite (MF) ve Nispi fekonditeyi (NF) belirlemek için gravimetrik yöntem kullanılmıştır (Bagenal ve Braum, 1978). Her bir ovaryumun başından, ortasından ve sonundan 1 g yumurta alınarak karıştırılmış ve %10'luk formaldehit çözeltisinde bekletilmiştir. Daha sonra yumurtalar sayılmıştır. Mutlak fekondite, 1 g'daki ortalama yumurta sayısı ile ovaryum ağırlığının çarpılması, nispi fekondite ise mutlak fekonditesinin vücut ağırlığına bölünmesi ile her bir birey için hesaplanmıştır (Wang ve ark., 2014).

İlk eşeyssel olgunluk boyu ile ilgili veriler denklemden yararlanılarak belirlenmiş ve lojistik eğriler çizilmiştir (King, 1995; Yalçın ve ark. 2004; Alp ve ark., 2005; Ceyhun ve Erdoğan 2008).

$$P=1/(1+\exp^{-(r(L-L_m))})$$

Formüldeki;

P: Her boy grubundaki olgun bireylerin oranını,

L: Total boyu,

L_m = İlk eşeyssel olgunluk boyunu,

r: Elde edilen lojistik eğrinin eğimini ifade etmektedir.

Fekondite-vücut ağırlığı (F-VA), Fekondite-total boy (F-TB), Fekondite-yumurta çapı (F-YÇ) ve Fekondite-yaş grubu (F-t) arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde regresyon analizi kullanılmıştır (Bingel, 2002). Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için Microsoft Office Excel 2010 ve SPSS 22.0 paket programlarından yararlanılmıştır. Elde edilen istatistiksel bulgular Fowler ve Cohen (1992)'e göre yorumlanmıştır.

BULGULAR

Cinsiyet ve Eşey Oranı

Araştırma süresince Uzunçayır Baraj Gölü'nden toplam 385 adet *C. trutta* bireyi yakalanmıştır. Bu bireylerin 218 adedini (%57.00) erkek, 167 adedini (%43.00) dişi bireylerin oluşturduğu ve erkek:dişi oranının 1:0.77 olduğu tespit edilmiştir. Bu oranın, beklenen cinsiyet oranından (1:1) istatistikî olarak farklı olmadığı görülmüştür ($X^2 = 3.38$; $p > 0.05$).

Kondisyon Faktörü

Ortalama kondisyon faktörü, hem dişi hem de erkeklerde Nisan ayında en yüksek seviyeye ulaşmış (Dişilerde: 1.16; Erkeklerde: 1.10), sonraki aylarda düşüş gerçekleşmiştir. En düşük seviyeye ulaştığı (Dişilerde: 0.88; Erkeklerde: 0.82) Temmuz ayından sonra tekrar yükselmeye başlamıştır (Şekil 2). Kondisyon faktörü değerlerinin aylara göre değişimi her iki eşey için de istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Anova testi; dişilerde $F=6.687$ $p < 0.05$ ve erkeklerde $F=14.110$ $p < 0.05$).

Gonadosomatik İndeks

C. trutta populasyonunun üreme zamanını saptamak amacıyla her eşeyin aylara göre gonadosomatik indeks (GSİ) değerleri hesaplanmıştır. Her iki eşeyde de ortalama GSİ değerlerinin Mayıs ayında maksimuma ulaştığı (Dişilerde: 4.187; Erkeklerde: 2.830) ve daha sonra hızla düştüğü belirlenmiştir (Şekil 3). Kondisyon faktörü ve gonadosomatik indeks değerleri incelendiğinde üremenin Mayıs ayında başladığı ve Temmuz ayında sona erdiği saptanmıştır. GSİ değerlerinin aylara göre değişimi her iki eşey için de istatistikî olarak önemli bulunmuştur (Anova testi; dişilerde $F=2.197$ $p < 0.05$ ve erkeklerde $F=10.231$ $p < 0.05$).

Yumurta Çapı

C. trutta populasyonuna ait dişi bireylerin yumurta

çapları aylık periyotlarda ölçülmüştür. En küçük ortalama yumurta çapı Kasım ayında (0.30 mm), en yüksek ortalama yumurta çapı değeri ise üreme döneminin başladığı Mayıs ayında (1.07 mm) saptanmıştır (Şekil 4). Yumurta çapı yaş grubu arttıkça küçülmüş, ortalama 0.58 ± 0.06 mm olarak bulunmuştur (Çizelge 1).


Çalışma süresince ovaryum içinde farklı büyüklük ve renkte yumurtalar tespit edilmiştir. Olgunlaşmamış yumurtaların yeşilimsi-gri ile kirli beyaz renkte, olgun yumurtaların ise portakal sarısı renginde olduğu görülmüştür.

Fekondite


Uzunçayır Baraj Gölü *C. trutta* populasyonundan yakalanan yumurtlama evresindeki 36 bireyde fekondite araştırılmıştır. Mutlak fekonditenin yaşa bağlı olarak arttığı ve ortalamasının 6546 ± 637 adet olduğu belirlenmiştir. Nispi fekondite, tüm yaş gruplarının ortalaması alındığında, 232.7 ± 21.3 adet/cm ve 29.7 ± 2.6 adet/g olarak hesaplanmıştır (Çizelge 1).

Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaşayan *C. trutta*'nın fekondite-vücut ağırlığı, fekondite-total boy ve fekondite-yaş grubu arasındaki ilişkiyi açıklayan denklemler hesaplanmıştır. Fekondite-vücut ağırlığı ile fekondite-total boy arasında zayıf düzeyde ($r=0.38$; $r=0.27$) bir ilişki olduğu bulunmuştur.


Fekondite-yaş grubu arasında ise pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu ($r=0.91$) tespit edilmiştir (Şekil 5, 6, 7).




Şekil 2. Kondisyon faktörü değerlerinin eşeylere ve aylara göre değişimi




Şekil 3. Gonadosomatik indeks (GSİ) değerlerinin eşeylere ve aylara göre değişimi




Şekil 4. Yumurta çapı değerlerinin aylara göre değişimi



Şekil 5. *C. trutta* populasyonunun fekondite-vücut ağırlığı (F-VA) ilişkisi




Şekil 6. *C. trutta* populasyonunun fekondite-total boy (F-TB) ilişkisi



Şekil 7. *C. trutta* populasyonunun fekondite-yaş grubu (F-t) ilişkisi

Eşeyssel Olgunluğa Ulaşma Boyu

C. trutta bireylerinin %50'sinin cinsi olgunluğa ulaştığı boyun (L_m = %50) erkek ve dişiler için sırasıyla; 19.36 cm ve 20.78 cm olduğu, erkeklerin boyca daha erken cinsi olgunluğa ulaştığı saptanmıştır (Şekil 8).



Şekil 8. *C. trutta* populasyonunun erkek ve dişi bireylerinde ilk eşeyssel olgunluğa ulaşma boyu

Çizelge 1. Yaş gruplarına göre total boy (TB), vücut ağırlığı (VA), yumurta çapı (YÇ), mutlak fekondite (F) ve nisbi fekondite (F/cm, F/g) değerleri

Yaş	N	TB (cm)	VA (g)	YÇ (mm)	F	F/cm	F/g
III	7	27.4±1.3	215.7±30.4	0.80±0.18	5320±1468	185.3±39.8	23.5±3.1
IV	18	27.8±0.9	234.8±21.4	0.58±0.08	6521±908	238.3±32.8	31.2±4.4
V	10	28.8±0.9	239.8±24.9	0.46±0.07	6960±1210	240.0±38.5	30.0±4.3
VI	1	29.3±0.0	264.0±00.0	0.41±0.00	11430±000	390.1±00.0	43.3±0.0
Toplam	36	28.0±0.6	233.3±13.7	0.58±0.06	6546±637	232.7±21.3	29.7±2.6

TARTIŞMA ve SONUÇ

Çalışma süresince incelenen 385 adet *Capoeta trutta* bireyinin çoğunluğunu erkekler oluşturmalarına rağmen (erkek:281 adet; dişi 167), belirlenen erkek/dişi oranının (1:0.77), beklenenden (1:1) istatistiki olarak farklı olmadığı tespit edilmiştir.

Kondisyon faktörü değerlerine bakıldığında, Nisan ayında en yüksek seviyeye ulaştığı, daha sonra hızla düştüğü görülmüştür.

GSİ değerlerindeki aylık değişimler analiz edilmiş ve

üreme döneminin Mayıs ayında başladığı ve Temmuz ayında sonlandığı tespit edilmiştir. Bu dönemde kondisyon faktörü değerlerinin de üremeye bağlı olarak düştüğü belirlenmiştir.

Aynı türün üreme dönemini; Polat (1987), Aşağı Fırat Suyunda Haziran ayında; Çökmez (2005), Karakaya Baraj Gölünde ve Oymak ve ark. (2008), Atatürk Baraj Gölü'nde Mayıs-haziran ayları arasında; Düşükcü ve Çalta (2012), Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde sırasıyla Mayıs-haziran, Haziran-temmuz ve Haziran-ağustos ayları arasında bildirmişlerdir.

Elde ettiğimiz değerler diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında genelde bir uyum görülmektedir. Farklı su ortamlarında özellikle sıcaklık farklılıklarından dolayı aynı türün üreme döneminin farklı olması beklenen bir durumdur.

En yüksek ortalama yumurta çapı değeri üreme döneminin başladığı Mayıs ayında (1.07 mm) saptanmıştır. Yumurta çapı yaş grubu arttıkça küçülmüş, ortalama 0.58 ± 0.06 mm olarak bulunmuştur.

Bazı araştırmacılar Polat (1987), Örün ve Erdemli (2002), Çökmez (2005), Bozkurt (1998), Oymak ve ark. (2008), Düşükcan ve Çalta (2012), Yüce ve ark. (2014), farklı su kaynaklarındaki *Capoeta trutta* için yumurta çapını 0.09 ile 2.20 mm arasında bildirmişlerdir (Çizelge 2). Aynı türe ait farklı populasyonlarda yumurta çapları farklı olabileceği gibi aynı zamanda, mevsime, yaşa ve ovaryum içerisindeki konumuna göre de değişebilmektedir.

Fekonditenin yaşa bağlı olarak arttığı ve yaş gruplarına göre ortalama alındığında 5320 ± 1468 (III.

yaş grubu) ile 11430 ± 000 (VI. yaş grubu) arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu konuda farklı araştırmalar tarafından farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yumurta verimini; Polat (1987), 1259-20935; Örün ve Erdemli (2002), 10440-61425; Oymak ve ark. (2008), 6871-33252; Düşükcan ve Çalta (2012), Keban Baraj Gölünde, 2870-29930; Karakaya Baraj Gölünde, 5192-56000 ve Atatürk Baraj Gölü'nde ise 3381-45125 olarak bildirmişlerdir.

İlk eşeyssel olgunluk boyu erkekler için 19.36 cm ve dişiler için 20.78 cm olarak belirlenmiştir. Farklı bölgelerde yapılan araştırmalarda bu değerler erkekler için 19.90-22.95 cm arasında, dişiler için 19.90-25.44 cm arasında bildirilmiştir. Çalışmalardaki bulgular ile bizim çalışmamızdaki bulgular arasında büyük oranda uyum görülmektedir. Eşeyssel olgunluğa ulaşma boyu, türe ve türün yaşadığı su ortamının fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre bazı farklılıklar gösterebilmektedir.

Çizelge 2. Farklı çalışmalardan elde edilen *Capoeta trutta* 'ya ait üreme biyolojisi ile ilgili parametreler

Kaynak	GSİ		Eşeyssel Olgunluk Boyu		Üreme Dönemi	Yumurta Çapı	Yumurta Verimi	Kondisyon Faktörü	
	♂	♀	♂	♀				♂	♀
1		0.92-4.37			Haz.		1259-20935	1.36-1.67	(♂+♀)
2		0.67-9.75	20.23*	19.93*	May.-Ağ.	0.41-1.76		1.12-1.36	1.12-1.36
3		0.82-10.2			Haz.-Tem.	0.68-1.11	10440-61425		
4		0.29-7.91			Mart-Haz.	0.37-1.04		1.22-1.38	1.15-1.33
5	0.76-5.53	0.88-8.65	19.90*	19.90*	May.-Haz.	0.42-1.69	6871-33252		
6a	0.39-1.32	0.42-2.61			May.-Haz.	0.60-1.10	2870-29930	1.16-1.51	1.05-1.41
6b	0.60-2.38	0.66-2.85			Haz.-Tem.	0.60-1.20	5192-56000	1.08-1.45	1.16-1.38
6c	0.57-4.07	0.91-7.95			Haz.-Ağ.	0.50-2.20	3381-45125	1.18-1.51	1.17-1.52
7a	0.49-7.76	0.72-5.91	22.55	24.06	May.-Ağ.	0.76-1.59	1809-45313	1.13-1.27	1.10-1.36
7b	0.53-12.8	0.55-10.0	22.67	25.44	May.-Ağ.	0.09-1.70	4361-74861	1.02-1.20	1.06-1.18
7c	0.41-7.70	0.42-14.3	22.95	24.82	May.-Ağ.	0.69-1.79	4102-55985	0.92-1.22	0.97-1.11
8	0.10-12.0	0.07-10.8	19.35	20.77	May.-Tem.	0.21-1.55	1362-15428	0.82-1.09	0.87-1.16

*Çatal Boy, 1. Polat (1987); 2. Bozkurt (1998); 3. Örün ve Erdemli (2002); 4. Çökmez (2005); 5. Oymak ve ark., (2008); 6. Düşükcan ve Çalta, (2012); 7. Yüce ve ark., (2014); 8. Bu çalışma

Capoeta trutta Uzunçayır Baraj Gölü'nün dominant türlerinden biridir. Türün baraj gölünde devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir maksimum ürün elde edebilmek için avcılığının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, bu çalışmada belirlenen üreme döneminde kaçak avcılığın önlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, ilk eşeyssel olgunluk boyundan küçük balıkları avlayan veya seçici olmayan av araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.

TEŞEKKÜR

Bu projeyi destekleyen TAGEM (TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/01) ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın büyüme özelliklerine yönelik araştırma makalesi 2014 yılında Yunus Araştırma Bülteni Dergisi'nin 2. sayısında yayınlanmıştır.

KAYNAKLAR

- Alp A, Kara C, Büyükçapar HM, Bülbül O 2005. Age, growth and condition of *Capoeta capoeta angorae* Hanko 1924 from the Upper Water Systems of the River Ceyhan, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, 29: 665-676.
- Avşar D 1998. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Baki Kitap ve Yayınevi, No: 20, Adana, 303s.
- Bagenal TB, Braum E 1978. Eggs and early life history. In: methods for assessment of fish production in freshwaters. (3rd. ed.), IBP Handbook No: 3, Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, Edinburg.
- Bingel F 2002. Balık Popülasyonlarının İncelenmesi. Baki Kitabevi, Seyhan-Adana, s.404.
- Bozkurt R 1998. Atatürk Baraj Gölü'ndeki *Acanthobrama marmid* Heckel 1843, *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) ve *Carasobarbus luteus* (Heckel, 1843)'un biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar, Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 116s.
- Ceyhun SB, Erdoğan O 2008. Kilise Deresi'nde (Hıms) Yaşayan *Capoeta capoeta umbla* (Heckel, 1843)'nın populasyon yapısı ve dere suyunun bazı özellikleri. Saltuk Buğrahan Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39(1): 35-41.
- Çalta M, Canpolat Ö 2007. Ağır metal kirlilik kaynaklarının Keban Baraj Gölü'nün su kalitesi, *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın üremesi ve gelişimi üzerindeki etkileri. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP), Proje No: 996, (Doktora Tezi Projesi).
- Çalta M, Canpolat Ö, Nacar A 2001. Elazığ Keban Baraj Gölü'nde yakalanan *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'da bazı ağır metal düzeylerinin belirlenmesi. IV. Su Ürünleri Sempozyumu, 800-811.
- Çelik EŞ, Bircan R 2004. Çanakkale Boğazı'ndaki siyah iskorpit balığı (*Scorpaena porcus* Linnaeus, 1758)'nın üreme özellikleri üzerine bir araştırma, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2): 327-335.
- Çoban MZ, Düşükcan M 2009. Üç farklı bölgedeki *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) populasyonunun et veriminin karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 4(3): 107-114.
- Çoban MZ, Gündüz F, Yüksel F, Demirel F, Yıldırım T, Kurtuluş M 2013. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Balık Faunası. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 35-44.
- Çökmez T 2005. Keban ve Karakaya Baraj Göllerindeki *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) balık türünün büyüme özelliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Duman E 2004. Keban Baraj Gölü'nde yaşayan *Capoeta trutta* Heckel, 1843'ün üreme biyolojisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1): 145-150.
- Düşükcan M, Çalta M 2012. *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki populasyonlarının üreme dönemlerinin karşılaştırılması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 24(2): 57-61.
- Fowler J, Cohen I 1992. Practical Statistics for Field Biology, John Wiley and Sons Inc., New York.
- Gül A, Yılmaz M, Solak K 1996. Fırat Nehri Tohma Suyu'nda yaşayan *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın büyüme özellikleri. Tr.J. Zool., 20: 177-185.
- Gündüz F, Çoban MZ, Yüksel F, Demirel F, Kurtuluş M, Yıldız N 2014. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın Bazı Populasyon Parametreleri. Yunus Araştırma Bülteni, (2): 3-14.
- Kalkan E 2008. Growth and reproduction properties of *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) in Karakaya Dam Lake. Turk J Zool, 32: 1-10.
- King M 1995. Fisheries Biology, Assessment and Management. Fishing News Books, Oxford, England.
- Kurt Kaya G, Erol Mercan R, Yüksel F, Kurtuluş M, Yıldız N, Gündüz F, Demirel F 2013. Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü'nde Yaşayan Karabalık (*Capoeta trutta* Heckel, 1843) ve Siraz (*Capoeta umbla* Heckel, 1843) Balıklarının Et Verimlerinin İncelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 4: 9-14.
- Mol S, Özden Ö, Oymak SA 2010. Trace metal contents in fish species from Ataturk Dam Lake (Euphrates, Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 209-213.
- Oymak SA, Doğan N, Uysal E 2008. Age, growth and reproduction of the Shabut *Barbus grypus* (Cyprinidae) in Atatürk Dam Lake (Euphrates River), Turkey. Cybium, 32(2): 145-152.
- Örüm İ, Erdemli AÜ 2002. A Study on blood parameters of *Capoeta trutta* (Heckel, 1843). Journal of Biological Sciences, 2 (8): 508-511.
- Özekinci U, Beğburs CR, Tenekecioğlu E 2003. Keban Baraj Gölü'nde *C. c. umbla* (Heckel, 1843) ve *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) (Siraz Balığı) avcılığında kullanılan galsama ağlarının seçiciliklerinin araştırılması, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20(3-4), 473-479.
- Öztürk S, Saler S, Girgin A, Şen D 1997. Karakaya Baraj Gölü'nde yaşayan *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın yaş tayininde en iyi okunan kemiksi yapıların belirlenmesi, IX Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül, Eğirdir/Isparta, 193.
- Polat N 1986. Keban Baraj Gölü'ndeki Bazı balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri ile Uzunluk-Ağırlık İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, Fırat Üniversitesi.
- Polat N 1987. Age Determination of *Capoeta trutta* (Heckel, 1843) in Keba Dam Lake. Doğa Tu. J. of Zoology, 11(3): 155-160.
- Şen D, Polat N, Ayvaz Y 1987. Keban Baraj Gölü'nde yaşayan *Capoeta trutta*'nın sindirim sistemi

- muhteviyatı. Veteriner Hekimler Odası Dergisi, 2(3): 53-58.
- Şevik R 1993. Aşağı Fırat sularında yaşayan *Capoeta trutta* (Heckel, 1843)'nın büyüme durumu ve üreme özellikleri üzerine araştırmalar. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran, Erzurum, 172-200.
- Şevik R, Hartavi Ş, Kılıç ÖS, Yüksel M 1998. Atatürk Baraj Gölü Bozova avlak sahası balık türlerinin bazı ekolojik özellikleri üzerine araştırmalar. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran, Erzurum, 589-596.
- URL. <http://www.dsi.gov.tr>. (Erişim tarihi: 15.01.2017).
- Wang J, Liu F, Zhang X, Cao WX, Liu HZ, Gao X 2014. Reproductive biology of Chinese minnow *Hemiculterella sauvagei* Warpachowski, 1888 in the Chishui River, China. J. Appl. Ichthyol., 30: 314-321.
- Yalçın Özdilek Ş, Turan C, Solak K, Akyurt İ 2004. Asi Nehri'nde Yaşayan *Barbus luteus* (Heckel, 1843)'un Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3: 164-170.
- Yapalak S, Yüksel M 1998. Atatürk Baraj Gölü (Fırat)'nda yaşayan *Capoeta trutta* (Heckel;1843)'nın büyüme özellikleri üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi, III Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran, Erzurum, 535-348.
- Yazıcıoğlu O, Yılmaz M 2011. Hirfanlı Baraj Gölü'nde yaşayan siraz balığı [*Capoeta sieboldii* (Steindachner, 1864)]'nın beslenme rejimi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1(3): 62-73.
- Yılmaz F, Solak K 1999. Dicle Nehrinde yaşayan *Capoeta trutta* (Heckel;1843)'nın beslenme organizmaları ve bu organizmaların aylara ve yaşlara göre değişimleri. Tr. J. of Zoology, 23(3): 973-978.
- Yüce S, Gündüz F, Demirel F, Örnekçi GN, Çelik B, Birici N, Şeker T, Özbey N, Küçükyılmaz M, Alpaslan K, Uslu AA, Tepe R, Güneş S, Özbay Ö, Saler S, Aydın R, Sönmez F, Çoban MZ, Şen D 2014. Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde Ekonomik Balıkların Bazı Populasyon Parametrelerinin Araştırılması. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Proje No: Tagem/Haysüd/2009/09/01/02.